

表 2 栄養指標

国・地域	低出生体重 児出生率 (%)	子どもの比率 (%) 1996-2004 *			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2004 *				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2003	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2004 *		
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症				発育障害	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			中・重度	中・重度
アフガニスタン	-	-	29	54	39	12	7	54	86 t	28		
アルバニア	3	6	24	6	14	1	11	34	-	62		
アルジェリア	7	13	38	22	10	3	8	19	-	69		
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アンゴラ	12	11	77	37	31	8	6	45	68	35		
アンティグアバーブーダ	8	-	-	-	10x	4x	10x	7x	-	-		
アルゼンチン	8	-	-	-	5	1	3	12	-	90x		
アルメニア	7	30	51	13	3	0	2	13	-	84		
オーストラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
オーストリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アゼルバイジャン	11	7	39	16	7	1	2	13	-	26		
バハマ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
バーレーン	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-		
バングラデシュ	36	36	69	94	48	13	13	43	87 t	70		
バルバドス	10x	-	-	-	6x	1x	5x	7x	-	-		
ベラルーシ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	55		
ベルギー	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベリーズ	6	24k	54	23	6x	1x	-	-	-	90x		
ベニン	16	38	66	62	23	5	8	31	98 t	72		
ブータン	15	-	-	-	19	3	3	40	-	95		
ボリビア	7	54	74	46	8	1	1	27	38	90		
ボスニア・ヘルツェゴビナ	4	6	-	-	4	1	6	10	-	77		
ボツワナ	10	34	57	11	13	2	5	23	-	66		
ブラジル	10x	-	30	17	6	1	2	11	-	88		
ブルネイ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ブルガリア	10	-	-	-	-	-	-	-	-	98		
ブルキナファソ	19	19	38	81	38	14	19	39	95 t	45		
ブルンジ	16	62	46	85	45	13	8	57	95	96		
カンボジア	11	12	72	59	45	13	15	45	47	14		
カメルーン	11	21	80	29	18	4	5	32	86	61		
カナダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カボヴェルデ	13	57k	64	13	14x	2x	6x	16x	-	0x		
中央アフリカ共和国	14	17	77	53	24	6	9	39	84	86		
チャド	10	2	77	66	28	9	11	29	-	58		
チリ	5	63	47	-	1	-	0	2	-	100		
中国	4	51	32	15	8	-	-	14	-	93		
コロンビア	9	26	58	25	7	1	1	14	-	92x		
コモロ	25	21	34	45	25	9	12	42	-	82		
コンゴ	-	4k	94	13	14	3	4	19	89	-		
コンゴ民主共和国	12	24	79	52	31	9	13	38	80 t	72		
クック諸島	3	19k	-	-	-	-	-	-	-	-		
コスタリカ	7	35x,k	47x	12x	5	0	2	6	-	97x		
コートジボワール	17	5	73	38	17	5	7	21	-	31		
クロアチア	6	23	-	-	1	-	1	1	-	90		
キューバ	6	41	42	9	4	0	2	5	-	88		
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チェコ	7	-	-	-	1x	0x	2x	2x	-	-		
デンマーク	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジブチ	-	-	-	-	18	6	13	26	75	-		
ドミニカ	10	-	-	-	5x	0x	2x	6x	-	-		
ドミニカ共和国	11	10	41	16	5	1	2	9	40	18		
エクアドル	16	35	70	25	12	-	-	26	-	99		
エジプト	12	30	72	31	9	1	4	16	-	56		
エルサルバドル	7	24	76	43	10	1	1	19	-	91x		
赤道ギニア	13	24	-	-	19	4	7	39	-	20x		
エリトリア	21x	52	43	62	40	12	13	38	52	68		
エストニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
エチオピア	15	55	43	77	47	16	11	52	65	28		
フィジー	10	47x,k	-	-	8x	1x	8x	3x	-	31x		

国・地域	低出生体重 児出生率 (%)	子どもの比率 (%) 1996-2004 *			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2004 *				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2003	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2004 *
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症	発育障害		
					中・重度	重度	中・重度	中・重度		
フィンランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランス	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	14	6	62	9	12	2	3	21	30	36
ガンビア	17	26	37	54	17	4	9	19	91	8
グルジア	7	18k	12	12	3	0	2	12	-	68
ドイツ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	16	53	62	67	22	5	7	30	78 t	28
ギリシャ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	9	39k	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	12	51	67	47	23	4	2	49	-	67
ギニア	16	23	43	73	21	-	11	33	98 t	68
ギニアビサウ	22	37	36	67	25	7	10	30	-	2
ガイアナ	12	11	42	31	14	3	11	11	-	-
ハイチ	21	24	73	30	17	4	5	23	25	11
パチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	14	35	61	34	17	-	1	29	35	80
ハンガリー	9	-	-	-	2x	0x	2x	3x	-	-
アイスランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インド	30	37k	44	66	47	18	16	46	45w	50
インドネシア	9	40	75	59	28	9	-	-	62	73
イラン	7x	44	-	0	11	2	5	15	-	94
イラク	15	12	51	27	16	2	6	22	-	40
アイルランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	10	-	-	-	4	-	2	5	-	100
日本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	10x	27	70	12	4	1	2	9	-	88
カザフスタン	8	36	73	17	4	0	2	10	-	83
ケニア	10	13	84	57	20	4	6	30	33	91
キリバス	5	80x,k	-	-	13x	-	11x	28x	45	-
朝鮮民主主義人民共和国	7	65	31	37	23	8	7	37	95 t	40
韓国	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クウェート	7	12k	26	9	10	3	11	24	-	-
キルギス	7x	24	77	21	11	2	3	25	-	42
ラオス	14	23	10	47	40	13	15	42	64	75
ラトビア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	6	27k	35	11	3	0	3	12	-	87
レソト	14	15	51	58	18	4	5	46	75 t	69
リベリア	-	35	70	45	26	8	6	39	-	x
リビア	7x	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	90x
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	17	67	78	64	42	11	13	48	91 t	75
マラウイ	16	44	93	77	22	-	5	45	92	49
マレーシア	9	29k	-	12	11	1	-	-	-	-
モルディブ	22	10	85	-	30	7	13	25	-	44
マリ	23	25	32	69	33	11	11	38	61	74
マルタ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	23	-
モーリタニア	-	20	78	57	32	10	13	35	-	2
モーリシャス	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	0x
メキシコ	8	38x,k	36x	21x	8	1	2	18	-	91
ミクロネシア連邦	18	60k	-	-	-	-	-	-	95 t	-
モルドバ	5	-	-	-	3	-	3	10	-	33
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	7	51	55	57	13	3	6	25	87 t	75
モロッコ	11x	31	66	15	9	2	4	24	-	41

表 2 栄養指標

国・地域	低出生体重 児出生率 (%)	子どもの比率 (%) 1996-2004 *			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2004 *				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2003	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2004 *		
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症				発育障害	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			中・重度	中・重度
モザンビーク	15	30	80	65	24	6	4	41	50	54		
ミャンマー	15	15k	66	67	32	7	9	32	87 t	60		
ナミビア	14	19	57	37	24	5	9	24	93	63		
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ネパール	21	68	66	92	48	13	10	51	96 t	63		
オランダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ニュージーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83		
ニカラグア	12	31	68	39	10	2	2	20	91	97		
ニジェール	13	1	56	61	40	14	14	40	95	15		
ナイジェリア	14	17	64	34	29	9	9	38	27	97		
ニウエ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ノルウェー	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パレスチナ自治区	9	29k	78	11	4	1	3	9	-	65		
オマーン	8	-	92	73	24x	4 x	13 x	23x	-	61		
パキスタン	19x	16x,k	31x	56x	38	12	13	37	95 t	17		
パラオ	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-		
パナマ	10	25x	38x	21x	7	-	1	14	-	95		
パプアニューギニア	11x	59	74	66	35x	-	-	-	1	-		
パラグアイ	9x	22	60	-	5	-	1	14	-	88		
ペルー	11x	67	76	49	7	1	1	25	-	93x		
フィリピン	20	34	58	32	28	-	6	30	76 t	56		
ポーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ポルトガル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カタール	10	12k	48	21	6x	-	2 x	8x	-	-		
ルーマニア	9	-	-	-	6x	1 x	3 x	8x	-	53		
ロシア連邦	6	-	-	-	3x	1 x	4 x	13x	-	35		
ルワンダ	9	84	79	71	27	7	6	41	86	90		
セントクリストファー・ネイビス	9	56k	-	-	-	-	-	-	-	100		
セントルシア	8	-	-	-	14x	-	6 x	11x	-	-		
セントビンセント・グレナディーン	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サモア	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サントメ・プリンシペ	20	56	53	42	13	2	4	29	-	74		
サウジアラビア	11x	31k	60	30	14	3	11	20	-	-		
セネガル	18	24k	64	49	23	6	8	25	-	16		
セルビア・モンテネグロ	4	11k	33	11	2	0	4	5	-	73		
セ・シェル	-	-	-	-	6x	0 x	2 x	5x	-	-		
シエラレオネ	23	4	51	53	27	9	10	34	84 t	23		
シンガポール	8	-	-	-	14x	-	4 x	11x	-	-		
スロバキア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スロベニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソロモン諸島	13x	65k	-	-	21x	4 x	7 x	27x	-	-		
ソマリア	-	9	13	8	26	7	17	23	-	-		
南アフリカ	15	7	67	30	12	2	3	25	-	62		
スペイン	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スリランカ	22	84	-	73	29	-	14	14	-	88		
スーダン	31	16	47	40	17x	7 x	-	-	34	1		
スリナム	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-		
スワジランド	9	24	60	25	10	2	1	30	80	59		
スウェーデン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スイス	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シリア	6	81k	50	6	7	1	4	18	-	79		
タジキスタン	15	50	-	-	-	-	5	36	-	28		
タンザニア	13	41	91	55	22	4	3	38	91 t	43		
タイ	9	4x,k	71x	27x	19x	-	6 x	16x	-	63		
旧ユーゴスラビア・マケドニア	6	37	8	10	6	1	4	7	-	80		
東ティモール	12	31	82	35	46	15	12	49	95	72		
トーゴ	18	18	65	65	25	7	12	22	84 t	67		
トンガ	0	62k	-	-	-	-	-	-	-	-		

国・地域	低出生体重 児出生率 (%)	子どもの比率 (%) 1996-2004 *			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2004 *				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2003	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2004 *			
		1998-2004 *	母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症			発育障害		
						中・重度	重度	中・重度			中・重度	中・重度	中・重度
トリニダードトバゴ	23	2	19	10	7x	0x	4x	5x	-	1			
チュニジア	7	47	-	22	4	1	2	12	-	97			
トルコ	16	21	38	24	4	1	1	12	-	64			
トルクメニスタン	6	13	71	27	12	2	6	22	-	100			
ツバル	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ウガンダ	12	63	75	50	23	5	4	39	-	95			
ウクライナ	5	22	-	-	1	0	0	3	-	32			
アラブ首長国連邦	15x	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-			
英国	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
米国	8	-	-	-	1x	0x	1x	2x	-	-			
ウルグアイ	8	-	-	-	5x	1x	1x	8x	-	-			
ウズベキスタン	7	19	49	45	8	2	7	21	93t	19			
バヌアツ	6	50k	-	-	20x	-	-	19x	-	-			
ベネズエラ	9	7k	50	31	4	1	3	13	-	90			
ベトナム	9	15	-	26	28	4	7	32	99t,w	83			
イエメン	32x	12	76	-	46	15	12	53	36	30			
ザンビア	12	40	87	58	23	-	5	49	73t	77			
ジンバブエ	11	33	90	35	13	2	6	27	46	93			

要約

サハラ以南のアフリカ	14	30	67	53	28	8	9	38	64	64
東部・南部アフリカ	14	41	69	58	29	8	7	41	68	60
西部・中部アフリカ	15	20	65	48	28	9	10	35	60	68
中東と北アフリカ	15	29	60	23	14	3	6	21	-	58
南アジア	31	38	45	69	46	16	14	44	58	49
東アジアと太平洋諸国	7	43	44	27	15	-	-	19	73e	85
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	-	45	26	7	1	2	16	-	86
CEE / CIS	9	22	45	26	5	1	3	14	-	47
先進工業国	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国	17	36	51	46	27	10	10	31	61e	69
後発開発途上国	19	34	63	65	36	11	10	42	76	53
世界	16	36	51	46	26	10	10	31	61e	68

各カテゴリーの国名は 132 ページを参照。

指標の定義

低出生体重 - 出生時の体重が 2,500 グラム未満であること。

低体重 - 中・重度: 年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満であること。重度: 年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 3 未満であること。

消耗症 - 中・重度: 身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満であること。

発育障害 - 中・重度: 年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満であること。

ビタミンAの補給率 - 2003年に高単位のビタミンAカプセルの補給を受けた生後 6-59カ月児の比率。

データの主な出典

低出生体重 - 人口保健調査 (DHS)、複数指標クラスター調査 (MICS)、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ。

母乳育児 - DHS、MICS、ユニセフ。

低体重・消耗症・発育障害 - DHS、MICS、ユニセフ、世界保健機関 (WHO)。

ビタミンA - ユニセフ、WHO。

ヨード添加塩 - MICS、DHS、ユニセフ。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。
- k 生後 4 カ月未満の乳児への母乳のみの育児を表す。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。
- t 2 回目のビタミン A 投与の実施率が 70% 以上の国を示す。
- e 東アジアと太平洋諸国のカテゴリーの数値は中国を含まない。
- w ビタミン A 補給プログラムにおいて、生後 59 カ月までのすべての子どもをプログラムの対象としていない国を示す。