

## 表2 栄養指標

国・地域	低出生体重 児出生率 (%) 1998-2005*	子どもの比率 (%) 1996-2005*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2005*				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2004	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2005*		
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症				発育障害	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			中・重度	中・重度
アフガニスタン	-	-	29	54	39	12	7	54	96t	28		
アルバニア	5	6	24	6	14	1	11	34	-	62		
アルジェリア	7	13	38	22	10	3	8	19	-	69		
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アンゴラ	12	11	77	37	31	8	6	45	77	35		
アンティグアバーブーダ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アルゼンチン	8	-	-	-	4	-	1	4	-	90x		
アルメニア	7	33	57	15	4	0	5	13	-	97		
オーストラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
オーストリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アゼルバイジャン	12	7	39	16	7	1	2	13	14	26		
バハマ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
バーレーン	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-		
バングラデシュ	36	36	69	90	48	13	13	43	83t	70		
バルバドス	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベラルーシ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	55		
ベルギー	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベリーズ	6	24k	54	23	-	-	-	-	-	90x		
ベナン	16	38	66	62	23	5	8	31	94t	72		
ブータン	15	-	-	-	19	3	3	40	-	95		
ボリビア	7	54	74	46	8	1	1	27	42	90		
ボスニア・ヘルツェゴビナ	4	6	-	-	4	1	6	10	-	62		
ボツワナ	10	34	57	11	13	2	5	23	62w	66		
ブラジル	8	-	30	17	6	1	2	11	-	88		
ブルネイ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ブルガリア	10	-	-	-	-	-	-	-	-	98		
ブルキナファソ	19	19	38	81	38	14	19	39	95t	45		
ブルンジ	16	62	46	85	45	13	8	57	94	96		
カンボジア	11	12	72	59	45	13	15	45	72t	14		
カメルーン	13	24	79	29	18	4	5	32	81	88		
カナダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カボヴェルデ	13	57k	64	13	-	-	-	-	-	0x		
中央アフリカ共和国	14	17	77	53	24	6	9	39	79	86		
チャド	22	2	77	65	37	14	14	41	84t	56		
チリ	6	63	47	-	1	-	0	1	-	100		
中国	4	51	32	15	8	-	-	14	-	93		
コロンビア	9	47	65	32	7	1	1	12	-	92x		
コモロ	25	21	34	45	25	-	8	44	7	82		
コンゴ	-	19	78	21	15	3	7	26	94	-		
コンゴ民主共和国	12	24	79	52	31	9	13	38	81t	72		
クック諸島	3	19k	-	-	-	-	-	-	-	-		
コスタリカ	7	35x,k	47x	12x	5	0	2	6	-	97x		
コートジボワール	17	5	73	38	17	5	7	21	60	84		
クロアチア	6	23	-	-	1	-	1	1	-	90		
キューバ	5	41	42	9	4	0	2	5	-	88		
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
チェコ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
デンマーク	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジブチ	16	-	-	-	27	8	18	23	-	-		
ドミニカ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ドミニカ共和国	11	10	41	16	5	1	2	9	-	18		
エクアドル	16	35	70	25	12	-	-	26	-	99		
エジプト	12	38	67	37	6	1	4	18	-	78		
エルサルバドル	7	24	76	43	10	1	1	19	-	62		
赤道ギニア	13	24	-	-	19	4	7	39	-	33		
エリトリア	14	52	43	62	40	12	13	38	50	68		
エストニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
エチオピア	15	49	54	86	38	11	11	47	52	28		
フィジー	10	47x,k	-	-	-	-	-	-	-	31x		
フィンランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フランス	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	低出生体重 児出生率 (%) 1998-2005*	子どもの比率 (%) 1996-2005*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2005*				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2004	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2005*
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症	発育阻害		
					中・重度	重度	中・重度	中・重度		
ガボン	14	6	62	9	12	2	3	21	-	36
ガンビア	17	26	37	54	17	4	8	19	27	8
グルジア	7	18k	12	12	3	0	2	12	-	68
ドイツ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	16	53	62	67	22	5	7	30	95	28
ギリシャ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	8	39k	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	12	51	67	47	23	4	2	49	18w	67
ギニア	16	27	41	71	26	7	9	35	95t	68
ギニアビサウ	22	37	36	67	25	7	10	30	64	2
ガイアナ	13	11	42	31	14	3	11	11	-	-
ハイチ	21	24	73	30	17	4	5	23	-	11
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	14	35	61	34	17	2	1	29	40	80
ハンガリー	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インド	30	37k	44	66	47	18	16	46	51w	57
インドネシア	9	40	75	59	28	9	-	-	73t	73
イラン	7x	44	-	0	11	2	5	15	-	94
イラク	15	12	51	27	12	3	8	23	-	40
アイルランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	10	-	-	-	4	-	4	3	-	100
日本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	12	27	70	12	4	1	2	9	-	88
カザフスタン	8	36	73	17	4	0	2	10	-	83
ケニア	10	13	84	57	20	4	6	30	63	91
キリバス	5	80x,k	-	-	-	-	-	-	58	-
朝鮮民主主義人民共和国	7	65	31	37	23	8	7	37	95t	40
韓国	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クウェート	7	12k	26	9	10	3	11	24	-	-
キルギス	7x	24	77	21	11	2	3	25	95	42
ラオス	14	23	10	47	40	13	15	42	48	75
ラトビア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	6	27k	35	11	4	-	5	11	-	92
レソト	13	36	79	60	20	4	4	38	71	91
リベリア	-	35	70	45	26	8	6	39	95	-
リビア	7x	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	90x
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	17	67	78	64	42	11	13	48	89t	75
マラウイ	16	53	78	80	22	5	5	48	57	49
マレーシア	9	29k	-	12	11	1	-	-	-	-
モルディブ	22	10	85	-	30	7	13	25	-	44
マリ	23	25	32	69	33	11	11	38	97	74
マルタ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	24	-
モーリタニア	-	20	78	57	32	10	13	35	95t	2
モーリシャス	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	0x
メキシコ	8	-	-	-	8	1	2	18	-	91
ミクロネシア連邦	18	60k	-	-	-	-	-	-	74	-
モルドバ	5	46	66	2	4	1	4	8	-	59
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	7	51	55	57	7	1	3	20	93t	75
モンテネグロ†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロッコ	15	31	66	15	10	2	9	18	-	59
モザンビーク	15	30	80	65	24	6	4	41	26	54
ミャンマー	15	15k	66	67	32	7	9	32	96t	60
ナミビア	14	19	57	37	24	5	9	24	-	63

## 表2 栄養指標

	低出生体重 児出生率 (%) 1998-2005*	子どもの比率 (%) 1996-2005*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2005*				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2004	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2005*		
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症				発育阻害	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			中・重度	中・重度
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ネパール	21	68	66	92	48	13	10	51	97t	63		
オランダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ニュージーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	83		
ニカラグア	12	31	68	39	10	2	2	20	98	97		
ニジェール	13	1	56	61	40	14	14	40	-	15		
ナイジェリア	14	17	64	34	29	9	9	38	85t	97		
ニウエ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ノルウェー	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
パレスチナ自治区	9	29k	78	11	5	1	3	10	-	64		
オマーン	8	-	92	73	18	1	7	10	95w	61		
パキスタン	19x	16x,k	31x	56x	38	13	13	37	95t	17		
パラオ	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-		
パナマ	10	25x	38x	21x	8	1	1	18	-	95		
バブアニューギニア	11x	59	74	66	-	-	-	-	32	-		
パラグアイ	9	22	60	-	5	-	1	14	-	88		
ペルー	11	64	81	41	8	0	1	24	-	91		
フィリピン	20	34	58	32	28	-	6	30	85t	56		
ポーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ポルトガル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
カタール	10	12k	48	21	6x	-	2x	8x	-	-		
ルーマニア	8	16	41	-	3	0	2	10	-	53		
ロシア連邦	6	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	35		
ルワンダ	9	90	69	77	23	4	4	45	95t	90		
セントクリストファー・ネイビス	9	56k	-	-	-	-	-	-	-	100		
セントルシア	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セントビンセント・グレナディーン	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サモア	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サントメ・プリンシペ	20	56	53	42	13	2	4	29	76t	74		
サウジアラビア	11x	31k	60	30	14	3	11	20	-	-		
セネガル	18	34	61	42	17	3	8	16	95	41		
セルビア†	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シエラレオネ	23	4	51	53	27	9	10	34	95t	23		
シンガポール	8	-	-	-	3	0	2	2	-	-		
スロバキア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スロベニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソロモン諸島	13x	65k	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソマリア	-	9	13	8	26	7	17	23	6	-		
南アフリカ	15	7	46	-	12	2	3	25	37	62		
スペイン	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スリランカ	22	53	-	73	29	-	14	14	57w	94		
スーダン	31	16	47	40	41	15	16	43	70	1		
スリナム	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-		
スワジランド	9	24	60	25	10	2	1	30	86	59		
スウェーデン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
スイス	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
シリア	6	81k	50	6	7	1	4	18	-	79		
タジキスタン	15	41	91	55	-	-	5	36	98t	28		
タンザニア	10	41	91	55	22	4	3	38	94t	43		
タイ	9	4x,k	71x	27x	18x	2x	5x	13x	-	63		
旧ユーゴスラビア・マケドニア	6	37	8	10	6	1	4	7	-	94		
東ティモール	12	31	82	35	46	15	12	49	43	72		
トーゴ	18	18	65	65	25	7	12	22	95t	67		
トンガ	0	62k	-	-	-	-	-	-	-	-		
トリニダード・トバゴ	23	2	19	10	6	1	4	4	-	1		
チュニジア	7	47	-	22	4	1	2	12	-	97		
トルコ	16	21	38	24	4	1	1	12	-	64		
トルクメニスタン	6	13	71	27	12	2	6	22	-	100		
ツバル	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	低出生体重 児出生率 (%) 1998-2005*	子どもの比率 (%) 1996-2005*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 1996-2005*				ビタミンAの 補給率 (6-59カ月児) (%) 2004	ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 1998-2005*		
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症				発育阻害	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			中・重度	中・重度
ウガンダ	12	63	75	50	23	5	4	39	68	95		
ウクライナ	5	22	-	-	1	0	0	3	-	32		
アラブ首長国連邦	15x	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-		
英国	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
米国	8	-	-	-	2	0	6	1	-	-		
ウルグアイ	8	-	-	-	5x	1x	1x	8x	-	-		
ウズベキスタン	7	19	49	45	8	2	7	21	86t	57		
バヌアツ	6	50k	-	-	-	-	-	-	-	-		
ベネズエラ	9	7k	50	31	5	1	4	13	-	90		
ベトナム	9	15	-	26	27	4	8	31	95t,w	83		
イエメン	32x	12	76	-	46	15	12	53	20	30		
ザンビア	12	40	87	58	20	-	6	50	50	77		
ジンバブエ	11	33	90	35	17	3	5	26	20	93		

## メモ

モンテネグロ独立以前のセルビア・モンテネグロ	4	11k	33	11	2	0	4	5	-	73
------------------------	---	-----	----	----	---	---	---	---	---	----

## 要約

サハラ以南のアフリカ	14	30	67	55	28	8	9	37	73	67
東部・南部アフリカ	13	40	69	63	27	7	7	40	60	60
西部・中部アフリカ	15	20	65	48	28	9	10	35	85	73
中東と北アフリカ	15	30	59	24	16	4	8	24	-	65
南アジア	29	38	47	69	45	16	14	44	62	54
東アジアと太平洋諸国	7	43	43	27	15	-	-	19	81**	85
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	-	49	26	7	1	2	15	-	86
CEE/CIS	9	22	47	28	5	1	3	14	-	50
先進工業国 <sup>§</sup>	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 <sup>§</sup>	16	36	52	46	27	10	10	31	68**	71
後発開発途上国 <sup>§</sup>	19	34	64	65	35	10	10	42	75	53
世界	15	36	52	46	25	9	9	30	68**	70

† モンテネグロは2006年6月にセルビア・モンテネグロから独立、2006年6月28日に国連加盟を承認されたために、モンテネグロとセルビアの個別のデータは存在していない。ここに掲載されているデータは、モンテネグロ独立前のセルビア・モンテネグロとしてのデータである（メモ欄を参照）。

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については136ページ参照。

## 指標の定義

**低出生体重**— 出生時の体重が2,500グラム未満であること。

**低体重**— 中・重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満であること。

**消耗症**— 中・重度：身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。

**発育阻害**— 中・重度：年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。

**ビタミンAの補給率**— 2004年に高単位のビタミンAカプセルの補給を少なくとも1回受けた生後6-59カ月児の比率。

**ヨード添加塩を使う世帯**— 適切なヨード添加処理が施された塩（15ppm以上）を消費する世帯の比率。

## データの主な出典

**低出生体重**— 人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ。

**母乳育児**— DHS、MICS、ユニセフ。

**低体重・消耗症・発育阻害**— DHS、MICS、世界保健機関（WHO）、ユニセフ。

**ヨード添加塩**— MICS、DHS、ユニセフ。

**ビタミンA**— ユニセフ、WHO。

## 注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであることを示す。
- k 生後4カ月未満の乳児への母乳のみの育児を表す。
- \* データが列の見出しで指定されている期間内に入手できたもっとも最近の年次のものであることを示す。
- t 2回目のビタミンA投与の実施率が70%以上の国を示す。
- \*\* 中国を除く。
- w ビタミンA補給プログラムにおいて、生後59カ月までのすべての子どもをプログラムの対象としていない国を示す。