

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児出生率 (%) 1999-2006 *	子どもの比率 (%) 2000-2006 *			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2006 *				ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2005		ヨード添加塩を使う世帯 (%) 2000-2006 *
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と補助食品 (6-9カ月)	母乳育児継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症	発育障害	少なくとも年1回補給* (%)	年2回補給^ (%)	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			
アフガニスタン	-	-	29	54	39	12	7	54	95	91	28
アルバニア	7	2	38	20	8	1	7	22	-	-	62
アルジェリア	6	7	39	22	4	1	3	11	-	-	61
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	12	11	77	37	31	8	6	45	79	65	35
アンティガバーブーダ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	7	-	-	-	4	-	1	4	-	-	90x
アルメニア	8	33	57	15	4	0	5	13	-	-	97
オーストラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	12	7	39	16	7	1	2	13	29	29w	26
バハマ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バーレーン	8	34x,k	65x	41x	9x	2x	5x	10x	-	-	-
バングラデシュ	22	37	52	89	48	13	13	43	83	82	84
バルバドス	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	4	9	38	4	1	0	1	3	-	-	55
ベルギー	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	6	24x,k	54x	23x	7	-	1	18	-	-	90x
ベナン	16	70	50	57	23	5	7	38	94	92	72
ブータン	15	-	-	-	19x	3x	3x	40x	-	-	96
ボリビア	7	54	74	46	8	1	1	27	39	39	90
ボスニア・ヘルツェゴビナ	5	18	29	10	2	0	3	7	-	-	62
ボツワナ	10	34	57	11	13	2	5	23	-	-	66
ブラジル	8	-	30x	17x	6x	1x	2x	11x	-	-	88
ブルネイ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ブルキナファソ	16	7	50	85	37	14	23	35	95	95	34
ブルンジ	11	45	88	-	39	14	7	53	69	17	98
カンボジア	11	60	82	54	36	7	7	37	79	65	73
カメルーン	11	21	64	21	19	5	6	30	95	95	49
カナダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カボヴェルデ	13	57x,k	64x	13x	-	-	-	-	-	-	0x
中央アフリカ共和国	13	23	55	47	29	8	10	38	-	-	62
チャド	22	2	77	65	37	14	14	41	95	93	56
チリ	6	63	47	-	1	-	0	1	-	-	100
中国	2	51	32	15	7	-	-	11	-	-	90
コロンビア	9	47	65	32	7	1	1	12	-	-	92x
コモロ	25	21	34	45	25	-	8	44	-	-	82
コンゴ	13	19	78	21	14	3	7	26	90	9	82
コンゴ民主共和国	12	24	79	52	31	9	13	38	92	87	72
クック諸島	3	19x,k	-	-	10x	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	7	35x,k	47x	12x	5x	0x	2x	6x	-	-	97x
コートジボワール	17	4	54	37	20	4	7	34	95	89	84
クロアチア	6	23x	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	90x
キューバ	5	41	42	9	4	0	2	5	-	-	88
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デンマーク	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	10	1	23	18	29	10	21	33	52	0	0
ドミニカ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	11	4	36	15	5	1	1	7	-	-	19
エクアドル	16	40	77	23	9	1	2	23	-	-	99x
エジプト	14	38	67	37	6	1	4	18	-	-	78
エルサルバドル	7	24	76	43	10	1	1	19	-	-	62
赤道ギニア	13	24	-	-	19	4	7	39	-	-	33
エリトリア	14	52	43	62	40	12	13	38	57	50	68
エストニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	20	49	54	-	38	11	11	47	59	59	20
フィジー	10	47x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	31x
フィンランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランス	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	低出生体重 児出生率 (%) 1999-2006*	子どもの比率 (%) 2000-2006*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2006*				ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2005		ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 2000-2006*
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症		少なくとも 年1回補給 ⁺ (%)	年2回 補給 [△] (%)	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			
ガボン	14	6	62	9	12	2	3	21	-	-	36
ガンビア	20	41	44	53	20	4	6	22	95	16	7
グルジア	7	18x,k	12x	12x	3x	0x	2x	12x	-	-	91
ドイツ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	9	54	58	56	18	3	5	22	95	95	32
ギリシャ	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	9	39x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	12	51	67	47	23	4	2	49	44	36w	67
ギニア	12	27	41	71	26	7	9	35	95	95	51
ギニアビサウ	24	16	35	61	19	4	7	41	-	-	1
ガイアナ	13	11	42	31	14	3	11	11	-	-	-
ハイチ	25	41	87	35	22	6	9	24	42	42	3
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	10	30	69	48	11	1	1	25	40	40	80x
ハンガリー	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インド	30	46	56	-	43	16	20	48	64	64w	51
インドネシア	9	40	75	59	28	9	-	-	76	76	73
イラン	7	44	-	0	11x	2x	5x	15x	-	-	99
イラク	15	25	51	36	8	1	5	21	-	-	28
アイルランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	12	15	36	24	4	-	4	3	-	-	100x
日本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	12	27	70	12	4	1	2	9	-	-	88
カザフスタン	6	17	39	16	4	1	4	13	-	-	92
ケニア	10	13	84	57	20	4	6	30	69	69	91
キリバス	5	80x,k	-	-	13x	-	-	-	62	60	-
朝鮮民主主義人民共和国	7	65	31	37	23	8	7	37	95	95	40
韓国	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クウェート	7	12x,k	26x	9x	10x	3x	11x	24x	-	-	-
キルギス	5	32	49	26	3	0	4	14	88	87	76
ラオス	14	23	10	47	40	13	15	42	63	62	75
ラトビア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	6	27k	35	11	4	-	5	11	-	-	92
レソト	13	36	79	60	20	4	4	38	9	2	91
リベリア	-	35	70	45	26	8	6	39	95	79	-
リビア	7	-	-	23x	5x	1x	3x	15x	-	-	90x
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	17	67	78	64	42	11	13	48	95	95	75
マラウイ	13	56	89	73	19	3	3	46	94	86	48
マレーシア	9	29x,k	-	12x	8	1	-	-	-	-	-
モルディブ	22	10	85	-	30	7	13	25	-	-	44
マリ	23	25	32	69	33	11	11	38	66	66	74
マルタ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	12	63x,k	-	-	-	-	-	-	6	6	-
モーリタニア	-	20	78	57	32	10	13	35	96	57	2
モーリシャス	14	21k	-	-	15x	2x	14x	10x	-	-	0x
メキシコ	8	38x,k	36x	21x	5	-	2	13	68	63	91
ミクロネシア連邦	18	60x,k	-	-	15x	-	-	-	89	73	-
モルドバ	6	46	18	2	4	1	4	8	-	-	60
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	6	57	57	65	6	1	2	21	92	92	83
モンテネグロ	4	19	35	13	3	1	3	5	-	-	71
モロッコ	15	31	66	15	10	2	9	18	-	-	59
モザンビーク	15	30	80	65	24	6	4	41	95	16	54
ミャンマー	15	15k	66	67	32	7	9	32	95	95	60
ナミビア	14	19	57	37	24	5	9	24	68	0	63

表2 栄養指標

	低出生体重児出生率 (%) 1999-2006*	子どもの比率 (%) 2000-2006*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2006*				ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2005		ヨード添加塩を使う世帯 (%) 2000-2006*
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と補助食品 (6-9カ月)	母乳育児継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症	発育障害	少なくとも年1回補給* (%)	年2回補給△ (%)	
					中・重度	重度	中・重度	中・重度			
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネパール	21	53	75	95	39	11	13	49	96	96	63
オランダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83x
ニカラグア	12	31	68	39	10	2	2	20	98	0	97
ニジェール	13	14	62	62	44	15	10	50	94	94	46
ナイジェリア	14	17	64	34	29	9	9	38	73	73	97
ニウエ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パレスチナ自治区	7	27	-	-	3	0	1	10	-	-	86
オマーン	8	-	92	73	18x	1x	7x	10x	-	-	61x
パキスタン	19	16x,k	31x	56x	38	13	13	37	95	95	17
パラオ	9	59x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	10	25x	38x	21x	8x	1x	1x	18x	4	4	95x
バプアニューギニア	11	59x	74x	66x	-	-	-	-	90	0	-
パラグアイ	9	22	60	-	5	-	1	14	-	-	88
ペルー	11	64	81	41	8	0	1	24	-	-	91
フィリピン	20	34	58	32	28	-	6	30	85	85	56
ポーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カタール	10	12x,k	48x	21x	6x	-	2x	8x	-	-	-
ルーマニア	8	16	41	-	3	0	2	10	-	-	74
ロシア連邦	6	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	-	35
ルワンダ	6	88	69	77	23	4	4	45	100	99	88
セントクリストファー・ネイビス	9	56x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントルシア	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	8	60	60	18	9	1	8	23	33	28	37
サウジアラビア	11	31x,k	60x	30x	14x	3x	11x	20x	-	-	-
セネガル	19	34	61	42	17	3	8	16	95	86	41
セルビア	5	15	39	8	2	0	3	6	-	-	73
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	24	8	52	57	30	8	9	40	95	95	45
シンガポール	8	-	-	-	3	0	2	2	-	-	-
スロバキア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	13	65k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソマリア	11	9	15	35	36	12	11	38	-	-	1
南アフリカ	15	7y	46y	-	12x	2x	3x	25x	33	29	62x
スペイン	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	22	53	-	73	29	-	14	14	64	61w	94
スーダン	31	16	47	40	41	15	16	43	90	90	1
スリナム	13	9	25	11	13	2	7	10	-	-	-
スワジランド	9	24	60	25	10	2	1	30	59	40	59
スウェーデン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スイス	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリア	9	29	37	16	10	2	9	22	-	-	79
タジキスタン	10	25	15	34	17	4	7	27	98	98	46
タンザニア	10	41	91	55	22	4	3	38	95	95	43
タイ	9	5	43	19	9	0	4	12	-	-	58
旧ユーゴスラビア・マケドニア	6	37x	8x	10x	2	0	2	9	-	-	94
東ティモール	12	31	82	35	46	15	12	49	91	35	72
トーゴ	12	28	35	44	26	7	14	24	95	92	25
トンガ	3	62x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリニダード・トバゴ	19	13	43	22	6	1	4	4	-	-	28
チュニジア	7	47	-	22	4	1	2	12	-	-	97
トルコ	16	21	38	24	4	1	1	12	-	-	64
トルクメニスタン	4	11	54	37	11	2	6	15	-	-	87
ツバル	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	低出生体重 児出生率 (%) 1999-2006*	子どもの比率 (%) 2000-2006*			栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2006*				ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2005		ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 2000-2006*	
		母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重		消耗症		発育障害	少なくとも 年1回補給 [†] (%)		年2回 補給 [△] (%)
					中・重度	重度	中・重度	中・重度				
ウガンダ	12	60	80	54	20	5	5	32	78	78	95	
ウクライナ	4	6	83	11	1	0	0	3	-	-	18	
アラブ首長国連邦	15	34x,k	52x	29x	14x	3x	15x	17x	-	-	-	
英国	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
米国	8	-	-	-	2	0	0	1	-	-	-	
ウルグアイ	8	-	-	-	5	1	2	11	-	-	-	
ウズベキスタン	5	26	45	38	5	1	3	15	82	82	53	
バヌアツ	6	50x,k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベネズエラ	9	7x,k	50x	31x	5	1	4	13	-	-	90x	
ベトナム	7	17	70	23	25	3	7	30	99	99w	93	
イエメン	32	12	76	-	46	15	12	53	15	15w	30	
ザンビア	12	40	87	58	20	-	6	50	66	66	77	
ジンバブエ	11	22	79	28	17	3	6	29	81	81	93x	

要約

サハラ以南のアフリカ	14	30	67	50	28	8	9	38	79	73	64
東部・南部アフリカ	14	39	71	56	28	7	7	41	73	64	54
西部・中部アフリカ	14	21	63	46	28	9	10	36	85	82	72
中東と北アフリカ	16	28	57	25	17	5	8	25	-	-	64
南アジア	29	45	55	-	42	15	18	46	71	71	51
東アジアと太平洋諸国	6	43	45	27	14	-	-	16	84	82**	84
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	-	-	-	7	-	2	16	-	-	85
CEE / CIS	6	19	44	23	5	1	2	12	-	-	50
先進工業国 [§]	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 [§]	16	38	56	40	26	10	11	32	75	72**	69
後発開発途上国 [§]	17	35	64	63	35	10	10	42	82	77	55
世界	15	38	56	39	25	9	11	31	75	72**	68

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については148ページ参照。

指標の定義

低出生体重—出生時の体重が2,500グラム未満であること。

低体重—中・重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。重度：年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満であること。

消耗症—中・重度：身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。

発育障害—中・重度：年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス2未満であること。

ビタミンAの補給率—2005年にビタミンAの補給を受けた生後6～59カ月児の比率。

ヨード添加塩を使う世帯—適切なヨード添加処理が施された塩（15ppm以上）を消費する世帯の比率。

データの主な出典

低出生体重—人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ。

母乳育児—DHS、MICS、ユニセフ。

低体重・消耗症・発育障害—DHS、MICS、世界保健機関（WHO）、ユニセフ。

ビタミンA—ユニセフ、WHO。

ヨード添加塩—MICS、DHS、ユニセフ。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- y 列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のデータ、標準的な定義によらないデータ、または国内の一部地域のみに関するデータではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計算に入れられたことを示す。
- * データが列の見出しで指定されている期間内に入手してきた直近の年次のものであることを示す。
- k 生後4カ月未満の乳児への母乳のみの育児を表す。
- w ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が6～59カ月よりも狭く設定されている国を示す。補給率は対象の月齢層にしたがって報告されている。
- † 2005年（報告時点での直近の実施年度）に少なくとも1回のビタミンA補給を受けた子どもの比率を示す。
- △ 2005年に2回のビタミンA補給を受けた子どもの比率については、2回の実施時期のうち補給率が低かった方の数字が報告されている。'0'（ゼロ）は2005年にビタミンA補給が1回しか実施されなかったことを示している。
- ** 中国を除く。