

表3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2006	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2006							肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満のうちに適切な保護措置を受けた比率 ^a (%) 2000-2006*	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満のうちに適切な保護措置を受けた比率 ^b (%) 2000-2006*	下痢をした5歳未満のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%) 2000-2006*	マラリア 2003-2006*			
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		BCG	1歳児			破傷風から保護される新生児 ^a (%)	2000-2006*	2000-2006*				蚊帳の下で眠る5歳未満の比率 (%)	殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満の比率 (%)	発熱した5歳未満のうち抗マラリア剤を処方された比率 (%)	
									結核	3種混合	ポリオ										はしか
アフガニスタン	39	63	31	34	49	29	0	90	90	77	77	68	-	-	88	28	-	48	-	-	-
アルバニア	96	99	94	91	99	84	-	98	98	98	97	97	98	-	87	45	38	50	-	-	-
アルジェリア	85	88	80	92	99	82	100	99	98	95	95	91	80	-	70	53	59	24	-	-	-
アンドラ	100	100	100	100	100	100	-	-	97	93	93	91	84	93	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	53	75	40	31	56	16	67	65	66	44	44	48	-	-	80	58	-	32	-	-	-
アンティグアバーブーダ	91	95	89	95	98	94	100	-	96	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	96	98	80	91	92	83	-	99	93	91	92	97	84	91	-	-	-	-	-	-	-
アルメニア	92	99	80	83	96	61	30	91	95	87	87	92	78	-	-	36	11	59	-	-	-
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	-	-	97	92	92	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	100	100	100	100	100	100	88	-	94	83	83	80	83	83	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	77	95	59	54	73	36	70	99	97	95	97	96	93	-	-	36	-	40	12x	1x	1x
バハマ	97	98	86	100	100	100	100	-	95	95	94	88	96	95	65	-	-	-	-	-	-
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	-	99	98	98	99	98	97	92	-	-	-	-	-	-
バングラデシュ	74	82	72	39	51	35	63	96	96	88	88	81	88	-	92	30	22	49	-	-	-
バルバドス	100	100	100	100	99	100	100	-	81	84	85	92	84	84	-	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	100	100	100	84	93	61	100	99	99	99	97	97	98	-	-	90	67	54	-	-	-
ベルギー	-	100	-	-	-	-	-	-	98	97	97	88	78	95	94	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	91	100	82	47	71	25	100	97	96	98	98	99	98	98	80	66x	-	-	-	-	-
ベナン	67	78	57	33	59	11	10	99	99	93	93	89	93	93	84	35	-	42	47	20	54
ブータン	62	86	60	70	65	70	-	92	98	95	96	90	95	-	88	-	-	-	-	-	-
ボリビア	85	95	68	46	60	22	69	93	94	81	79	81	81	81	-	52	-	54	-	-	-
ボスニア・ヘルツェゴビナ	97	99	96	95	99	92	85	97	94	87	91	90	82	85	85	91	73	53	-	-	-
ボツワナ	95	100	90	42	57	25	100	99	98	97	97	90	85	-	71	14	-	7	-	-	-
ブラジル	90	96	57	75	83	37	-	99	99	99	99	99	97	99	84	46x	15x	28x	-	-	-
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	96	99	99	99	97	99	99	92	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	99	100	97	99	100	96	100	98	97	95	96	96	96	-	65	-	-	-	-	-	-
ブルキナファソ	61	94	54	13	42	6	17	99	99	95	94	88	76	76	-	39	15	42	18	10	48
ブルンジ	79	92	77	36	47	35	1	84	86	74	64	75	74	74	84	38	26	23	13	8	30
カンボジア	41	64	35	17	53	8	0	87	85	80	80	78	80	-	80	48	-	59	88	4	0
カメルーン	66	86	44	51	58	43	20	85	87	81	78	73	81	-	52	35	38	22	27	13	58
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	-	97	94	94	94	14	94	82	-	-	-	-	-	-
カボヴェルデ	80	86	73	43	61	19	90	70	74	72	72	65	69	-	-	-	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	75	93	61	27	47	12	0	70	65	40	40	35	-	-	74	32	39	47	33	15	57
チャド	42	41	43	9	24	4	55	40	45	20	36	23	-	-	60	12	-	27	27x	1x	32x
チリ	95	100	58	91	95	62	100	98	95	94	94	91	94	94	-	-	-	-	-	-	-
中国	77	93	67	44	69	28	-	92	94	93	94	93	91	-	-	-	-	-	-	-	-
コロンビア	93	99	71	86	96	54	100	88	95	86	86	88	86	86	88	62	-	39	24x	-	-
コモロ	86	92	82	33	41	29	0	84	78	69	69	66	69	-	77	49	-	31	36x	9x	63x
コンゴ	58	84	27	27	28	25	75	84	81	79	79	66	-	-	84	48	-	39	68	6	48
コンゴ民主共和国	46	82	29	30	42	25	0	87	87	77	78	73	-	-	77	36	-	17	12x	1x	52x
クック諸島	94	98	88	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	97	100	92	92	89	97	-	88	89	91	91	89	90	89	-	-	-	-	-	-	-
コートジボワール	84	97	74	37	46	29	28	77	95	77	76	73	77	-	-	35	19	45	17	6	36
クロアチア	100	100	100	100	100	100	100	98	96	96	96	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-
キューバ	91	95	78	98	99	95	99	99	96	89	99	96	89	97	-	-	-	-	-	-	-
キプロス	100	100	100	100	100	100	36	-	99	97	97	87	93	90	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	100	100	100	98	99	97	-	99	98	98	98	97	98	97	-	-	-	-	-	-	-
デンマーク	100	100	100	-	-	-	100	-	93	93	93	99	-	93	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	73	76	59	82	88	50	-	88	76	72	72	67	-	-	77	62	43	33	9	1	10
ドミニカ	97	100	90	84	86	75	100	99	99	95	88	99	7	7	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	95	97	91	78	81	73	69	95	93	81	85	99	74	69	85	63	-	42	-	-	-
エクアドル	94	97	89	89	94	82	100	99	99	98	97	97	98	98	66	-	-	-	-	-	-
エジプト	98	99	97	70	86	58	100	99	98	98	98	98	98	-	86	63	-	27	-	-	-
エルサルバドル	84	94	70	62	77	39	100	93	98	96	96	98	96	96	91	62	-	-	-	-	-
赤道ギニア	43	45	42	53	60	46	0	73	65	33	39	51	-	-	59	-	-	36	15x	1x	49x
エリトリア	60	74	57	9	32	3	10	99	99	97	96	95	97	-	79	44	-	54	12x	4x	4x
エストニア	100	100	99	97	97	96	100	99	98	95	95	96	95	88	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	22	81	11	13	44	7	0	72	80	72	69	63	-	-	80	19	-	15	2	2	3
フィジー	47	43	51	72	87	55	100	93	84	81	83	99	81	81	93	-	-	-	-	-	-
フィンランド	100	100	100	100	100	100	100	98	99	97	97	97	-	98	-	-	-	-	-	-	-
フランス	100	100	100	-	-	-	-	84	98	98	98	87	29	87	-	-	-	-	-	-	-

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2006	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2006							破傷風から保護される新生児 ^a (%)	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の子どもが適切な保健サービスを受けた比率 (%) 2000-2006*	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の子どもが適切な保健サービスを受けた比率 (%) 2000-2006*	マラリア 2003-2006*				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1 歳児										2000-2006*	2000-2006*	蚊の下の5歳未満の子どもに殺虫剤を散布した比率 (%)	殺虫剤を散布した5歳未満の子どもにマラリア予防薬を処方された比率 (%)	発熱した5歳未満の子どもにマラリア予防薬を処方された比率 (%)
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib	対応ワクチン								
ガボン	88	95	47	36	37	30	100	89	69	38	31	55	38	-	63	48	-	44	-	-	-	
ガンビア	82	95	77	53	72	46	35	99	95	95	95	95	95	95	94	69	61	38	63	49	63	
グルジア	82	96	67	94	96	91	71	95	99	87	88	95	83	-	87	99	-	-	-	-	-	
ドイツ	100	100	100	100	100	100	-	-	96	90	96	94	86	94	-	-	-	-	-	-	-	
ガーナ	75	88	64	18	27	11	-	99	87	84	84	85	84	84	-	59	33	29	33	22	61	
ギリシャ	-	-	-	-	-	-	-	88	96	88	87	88	88	88	69	-	-	-	-	-	-	
グレナダ	95	97	93	96	96	97	100	-	87	91	91	98	91	91	-	-	-	-	-	-	-	
グアテマラ	95	99	92	86	90	82	-	96	93	80	81	95	80	80	91	64	-	22x	6x	1x	-	
ギニア	50	78	35	18	31	11	40	90	99	71	70	67	-	-	79	42	-	38	12	0	44	
ギニアビサウ	59	79	49	35	57	23	-	87	85	77	74	60	-	-	91	57	42	25	73	39	46	
ガイアナ	83	83	83	70	86	60	100	96	95	93	92	90	93	93	31	78	-	40	74	6	1	
ハイチ	54	52	56	30	57	14	-	75	83	53	52	58	-	-	94	31	3	43	-	-	5	
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホンジュラス	87	95	81	69	87	54	100	90	95	87	87	91	87	87	-	56	54	49	-	-	1	
ハンガリー	99	100	98	95	100	85	100	99	99	99	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
アイスランド	100	100	100	100	100	100	-	-	97	97	97	95	-	97	86	-	-	-	-	-	-	
インド	86	95	83	33	59	22	100	78	78	55	58	59	6	-	83	69	-	32	-	-	12x	
インドネシア	77	87	69	55	73	40	87	82	88	70	70	72	70	-	87	61	-	56	32x	0x	1	
イラン	94	99	84	-	-	-	100	99	99	99	99	99	99	-	-	93	-	-	-	-	-	
イラク	81	97	50	79	95	48	100	91	83	60	63	60	75	-	89	82	82	64	7x	0x	1x	
アイルランド	-	100	-	-	-	-	100	93	97	91	91	86	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
イスラエル	100	100	100	-	100	-	-	-	98	95	93	95	95	96	-	-	-	-	-	-	-	
イタリア	-	-	-	-	-	-	-	-	97	96	97	87	96	95	52	-	-	-	-	-	-	
ジャマイカ	93	98	88	80	91	69	100	90	86	85	86	87	87	87	72	75	52	39	-	-	-	
日本	100	100	100	100	100	100	-	-	99	99	97	99	-	-	86	-	-	-	-	-	-	
ヨルダン	97	99	91	93	94	87	100	95	99	98	98	99	98	98	-	78	-	44	-	-	-	
カザフスタン	86	97	73	72	87	52	100	99	99	99	99	99	99	-	-	71	32	48	-	-	-	
ケニア	61	83	46	43	46	41	80	92	90	80	77	77	80	80	74	49	-	33	15	5	27	
キリバス	65	77	53	40	59	22	100	99	98	86	86	61	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	100	59	58	60	-	96	91	89	98	96	96	-	-	93	-	-	-	-	-	
韓国	92	97	71	-	-	-	-	98	98	98	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
クウェート	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99	99	99	99	90	-	-	-	-	-	-	
キルギス	77	98	66	59	75	51	40	99	96	92	93	97	90	-	82	62	45	22	-	-	-	
ラオス	51	79	43	30	67	20	0	61	68	57	56	48	57	-	52	36	-	37	82x	18x	9x	
ラトビア	99	100	96	78	82	71	100	99	99	98	98	95	97	99	-	-	-	-	-	-	-	
レバノン	100	100	100	98	100	87	100	-	98	92	92	96	88	92	72	74	-	-	-	-	-	
レソト	79	92	76	37	61	32	1	96	95	83	80	85	85	-	72	59	-	53	-	-	-	
リベリア	61	72	52	27	49	7	0	89	99	88	87	94	-	-	-	70	-	-	11	3	-	
リビア	-	-	-	97	97	96	100	99	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リトアニア	-	-	-	-	-	-	100	99	98	94	94	97	95	94	-	-	-	-	-	-	-	
ルクセンブルク	100	100	100	-	-	-	-	-	99	99	99	95	95	98	-	-	-	-	-	-	-	
マダガスカル	50	77	35	34	48	26	18	72	71	61	63	59	61	-	67	48	-	47	30x	0x	34	
マラウイ	73	98	68	61	62	61	20	99	99	99	99	85	99	99	84	51	29	26	29	23	24	
マレーシア	99	100	96	94	95	93	100	99	88	96	96	90	87	89	88	-	-	-	-	-	-	
モルディブ	83	98	76	59	100	42	75	99	99	98	98	97	98	-	85	22	-	-	-	-	-	
マリ	50	78	36	46	59	39	77	85	95	85	83	86	90	16	-	36	-	45	-	-	-	
マルタ	100	100	100	-	100	-	70	-	85	85	83	94	86	83	62	-	-	-	-	-	-	
マーシャル諸島	87	82	96	82	93	58	100	92	90	74	95	96	87	60	-	-	-	-	-	-	-	
モーリタニア	53	59	44	34	49	8	100	86	85	68	68	62	68	-	94	41	-	9	31	2	33	
モーリシャス	100	100	100	94	95	94	100	97	96	97	98	99	97	96	-	-	-	-	-	-	-	
メキシコ	97	100	87	79	91	41	100	99	99	98	98	96	98	98	87	-	-	-	-	-	-	
ミクロネシア連邦	94	95	94	28	61	14	100	55	86	67	81	83	84	59	-	-	-	-	-	-	-	
モルドバ	92	97	88	68	86	52	-	99	97	97	98	96	98	-	-	60	-	48	-	-	-	
モナコ	100	100	-	100	100	-	-	90	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
モンゴル	62	87	30	59	75	37	-	98	99	99	98	99	98	56	87	63	71	47	-	-	-	
モンテネグロ	-	-	-	-	-	-	-	98	95	90	90	90	90	90	85	89	57	64	-	-	-	
モロッコ	81	99	56	73	88	52	100	95	99	97	97	95	95	10	-	38	-	46	-	-	-	
モザンビーク	43	72	26	32	53	19	100	87	88	72	70	77	72	-	85	55	-	47	10	-	15	
ミャンマー	78	80	77	77	88	72	-	85	86	82	82	78	75	-	87	66	-	65	-	-	-	
ナミビア	87	98	81	25	50	13	100	88	90	74	74	63	-	-	81	53	-	39	7x	-	14x	

表3 保健指標

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2006	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2006							肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の適切な保護を受けた比率 (%) 2000-2006*	肺炎と疑われる症状を呈している5歳未満の適切な保護を受けた比率 (%) 2000-2006*	下痢をした5歳未満のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%) 2000-2006*	マラリア 2003-2006*				
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		BCG	1歳児			破傷風から保護される新生児 ^a (%)	2000-2006*	2000-2006*				蚊帳の下で眠る5歳未満の比率 (%)	殺虫処理を施した5歳未満の比率 (%)	発熱した5歳未満のうちマラリア剤を与えられた比率 (%)		
									結核	3種混合	ポリオ										はしか	B型肝炎
ナウル	-	-	-	-	-	-	0	99	98	72	45	99	99	-	-	-	-	-	-	-		
ネパール	90	96	89	35	62	30	18	93	93	89	91	85	69	-	83	43	25	43	-	-	-	
オランダ	100	100	100	100	100	100	100	-	98	98	98	96	-	97	-	-	-	-	-	-	-	
ニュージーランド	-	100	-	-	-	-	100	-	92	89	89	82	87	80	-	-	-	-	-	-	-	
ニカラグア	79	90	63	47	56	34	83	99	94	87	88	99	87	87	94	57	-	49	-	-	2x	
ニジェール	46	80	36	13	43	4	19	64	58	39	55	47	-	-	53	27	-	43	15	7	33	
ナイジェリア	48	67	31	44	53	36	100	69	72	54	61	62	41	-	71	33	-	28	6	1	34	
ニウエ	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
ノルウェー	100	100	100	-	-	-	100	-	97	93	93	91	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
パレスチナ自治区	92	94	88	73	78	61	-	99	98	96	96	99	97	-	-	65	-	-	-	-	-	
オマーン	-	-	-	-	97	-	-	99	98	98	98	96	99	98	94	-	-	-	-	-	-	-
パキスタン	91	96	89	59	92	41	100	89	90	83	83	80	83	-	80	66x	16x	-	-	-	-	
パラオ	85	79	94	80	96	52	100	-	98	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-	
パナマ	90	99	79	73	89	51	100	99	99	99	99	94	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
バブアニューギニア	39	88	32	44	67	41	100	75	85	75	75	65	70	-	81	75x	-	-	-	-	-	
パラグアイ	86	99	68	80	94	61	100	75	90	73	72	88	73	73	82	51x	29x	-	-	-	-	
ペルー	83	89	65	63	74	32	96	99	98	94	95	99	94	94	64	68	-	57	-	-	-	
フィリピン	85	87	82	72	80	59	100	91	90	88	88	92	77	-	57	55	-	76	-	-	-	
ポーランド	-	-	-	-	-	-	-	94	99	99	99	99	98	31	-	-	-	-	-	-	-	
ポルトガル	-	-	-	-	-	-	-	89	94	93	93	93	94	93	-	-	-	-	-	-	-	
カタール	100	100	100	100	100	100	100	99	99	96	95	99	96	96	-	-	-	-	-	-	-	
ルーマニア	57	91	16	-	89	-	100	99	98	97	97	95	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロシア連邦	97	100	88	87	93	70	-	97	99	99	99	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
ルワンダ	74	92	69	42	56	38	28	98	99	99	99	95	99	99	82	28	-	24	16	13	12	
セントクリストファー・ネイビス	100	99	99	95	96	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
セントルシア	98	98	98	89	89	89	-	94	94	85	85	94	85	85	-	-	-	-	-	-	-	
セントビンセント・グレナディーン	-	-	93	-	-	96	100	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
サモア	88	90	87	100	100	100	100	84	80	56	57	54	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95	95	94	95	95	-	-	-	-	-	-	-	
サントメ・プリンシペ	79	89	73	25	32	20	0	98	99	99	97	85	75	-	-	47	-	63	53	42	25	
サウジアラビア	-	97	-	-	100	-	100	95	97	96	96	95	96	96	56	-	-	-	-	-	-	
セネガル	76	92	60	57	79	34	37	99	99	89	89	80	89	89	86	47	-	43	14	7	27	
セルビア	-	-	-	-	-	-	-	99	97	92	97	88	93	42	-	93	57	31	-	-	-	
セーシェル	88	100	75	-	-	100	100	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
シエラレオネ	57	75	46	39	53	30	-	82	77	64	64	67	-	-	-	48	21	31	20	5	52	
シンガポール	100	100	-	100	100	-	-	98	96	95	95	93	94	-	4	-	-	-	-	-	-	
スロバキア	100	100	99	99	100	98	100	98	99	99	99	98	99	99	73	-	-	-	-	-	-	
スロベニア	-	-	-	-	-	-	70	-	98	97	97	96	-	97	74	-	-	-	-	-	-	
ソロモン諸島	70	94	65	31	98	18	-	84	96	91	91	84	93	-	74	-	-	-	-	-	-	
ソマリア	29	32	27	26	48	14	0	50	40	35	35	35	-	-	-	13	32	7	18	9	8	
南アフリカ	88	99	73	65	79	46	100	97	99	99	99	85	99	99	88	75x	-	37x	-	-	-	
スペイン	100	100	100	100	100	100	100	-	98	98	98	97	81	98	72	-	-	-	-	-	-	
スリランカ	79	98	74	91	98	89	68	99	99	99	98	99	98	-	93	-	-	-	-	-	-	
スーダン	70	78	64	34	50	24	0	77	91	78	77	73	60	-	-	57	-	38	23x	0x	50x	
スリナム	92	98	73	94	99	76	-	-	94	84	84	83	84	84	-	58	-	43	77x	3x	-	
スワジランド	62	87	54	48	59	44	100	78	73	68	67	57	68	-	-	60	-	24	0x	0x	26x	
スウェーデン	100	100	100	100	100	100	-	17	99	99	99	95	-	99	86	-	-	-	-	-	-	
スイス	100	100	100	100	100	100	5	-	98	95	94	86	-	92	93	-	-	-	-	-	-	
シリア	93	98	87	90	99	81	100	99	99	99	99	98	98	99	87	77	71	34	-	-	-	
タジキスタン	59	92	48	51	70	45	5	94	93	86	81	87	86	-	88	64	41	22	2	1	2	
タンザニア	62	85	49	47	53	43	83	99	94	90	91	93	90	-	-	59	-	53	31	16	58	
タイ	99	98	100	99	98	99	100	99	99	98	98	96	96	-	-	84	65	46	-	-	-	
旧ユーゴスラビア・マケドニア	-	-	-	-	-	-	-	92	95	93	92	94	89	-	88	93	74	45	-	-	-	
東ティモール	58	77	56	36	66	33	0	72	75	67	66	64	-	-	63	24	-	-	48x	8x	47x	
トーゴ	52	80	36	35	71	15	100	96	91	87	87	83	-	-	84	23	26	22	41	38	48	
トンガ	100	100	100	96	98	96	75	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	
トリニダード・トバゴ	91	92	88	100	100	100	100	-	93	92	89	89	89	89	-	74	34	32	-	-	-	
チュニジア	93	99	82	85	96	65	100	99	99	99	99	98	99	-	89	43	-	-	-	-	-	
トルコ	96	98	93	88	96	72	-	88	92	90	90	98	82	-	67	41	-	19x	-	-	-	
トルクメニスタン	72	93	54	62	77	50	-	99	99	98	98	99	98	-	-	83	50	25	-	-	-	
ツバル	100	94	92	90	93	84	10	99	99	97	97	84	97	-	-	-	-	-	-	-	-	

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2004			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2004			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2006	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2006							破傷風から保護される新生児 ^λ (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 [±] (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 [±] (%)	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)	マラリア 2003-2006 [*]					
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		2006	1歳児										2000-2006 [*]	2000-2006 [*]	蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率 (%)	殺虫処理を施した5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうちマラリア剤を与えられた比率 (%)	
									結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib										BCG
ウガンダ	60	87	56	43	54	41	8	85	89	80	81	89	80	80	88	67	-	29	22	10	62			
ウクライナ	96	99	91	96	98	93	99	97	98	98	99	98	96	11	-	-	-	-	-	-	-			
アラブ首長国連邦	100	100	100	98	98	95	-	98	97	94	94	92	92	94	-	-	-	-	-	-	-			
英国	100	100	100	-	-	-	100	-	97	92	92	85	-	92	-	-	-	-	-	-	-			
米国	100	100	100	100	100	100	-	-	99	96	92	93	92	94	-	-	-	-	-	-	-			
ウルグアイ	100	100	100	100	100	99	100	99	99	95	95	94	94	95	95	-	-	-	-	-	-			
ウズベキスタン	82	95	75	67	78	61	64	98	96	95	94	95	97	-	87	68	56	28	-	-	-			
バヌアツ	60	86	52	50	78	42	100	92	90	85	85	99	85	-	52	-	-	-	-	-	-			
ベネズエラ	83	85	70	68	71	48	-	83	78	71	73	55	71	71	88	72	-	51	-	-	-			
ベトナム	85	99	80	61	92	50	80	95	94	94	94	93	93	-	61	71	-	65	94	5	3			
イエメン	67	71	65	43	86	28	100	70	92	85	85	80	85	85	-	47	-	18x	-	-	-			
ザンビア	58	90	40	55	59	52	85	94	94	80	80	84	80	80	90	69	-	48	27	23	58			
ジンバブエ	81	98	72	53	63	47	0	99	95	90	90	90	90	-	80	50x	-	80x	7	3	5			

要約

サハラ以南のアフリカ	55	81	41	37	53	28	49	82	83	72	74	72	48	24	77	40	-	30	15	8	34
東部・南部アフリカ	56	86	42	38	58	30	43	85	86	78	77	76	58	36	81	44	-	32	15	9	28
西部・中部アフリカ	55	76	40	36	49	26	55	79	81	67	70	68	38	13	72	36	-	29	16	7	40
中東と北アフリカ	88	95	78	74	90	53	88	92	95	91	91	89	88	24	81	66	-	38	-	-	-
南アジア	85	94	81	37	63	27	91	82	82	63	66	65	25	-	84	62	-	35	-	-	-
東アジアと太平洋諸国	79	92	70	51	73	36	-	91	92	89	89	89	86	2	-	64**	-	61**	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	91	96	73	77	86	49	96	96	96	92	92	93	89	90	84	-	-	-	-	-	-
CEE / CIS	91	98	79	84	93	70	-	95	96	95	95	97	92	3	-	57	-	-	-	-	-
先進工業国 [§]	100	100	100	100	100	99	-	-	98	96	94	93	64	82	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 [§]	80	92	70	50	73	33	78	86	88	78	79	78	59	17	80	56**	-	38**	-	-	-
後発開発途上国 [§]	59	79	51	36	55	29	33	85	87	77	77	74	50	17	82	40	-	37	-	-	-
世界	83	95	73	59	80	39	78	87	89	79	80	80	60	22	80	56**	-	38**	-	-	-

§ 各国・地域グループに属する領域も含む。分類については148ページ参照。

指標の定義

政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率—子どもを守るために定期的に実施される予防接種のワクチンのうち、中央政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの比率。

EPI—拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合：DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎（HepB）やヘモフィルス・インフルエンザb型菌（Hib）、黄熱病の）予防接種を含めている国もある。

BCG—カルメット・ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の率。

3種混合（DPT 1）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受けた乳児の率。

3種混合（DPT 3）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の率。

HepB3—B型肝炎の予防接種を3回受けた乳児の率。

Hib 3—ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質を処方された子どもの比率（%）—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0～4歳の子どものうち、抗生物質を処方された子どもの比率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた子どもの比率（%）—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0～4歳の子どものうち、適切な保健措置を受けた子どもの比率。

下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率—調査前2週間に下痢をした0～4歳の子どものうち、経口補水療法（ORT：経口補水塩または推奨された方法で、家庭で調合された吸収のよい安全な水分）または水分補給を受け、さらに授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア：

蚊帳の下で眠る5歳未満児の比率（%）—0～4歳の子どもで蚊帳の下で眠った子どもの比率。

殺虫処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率（%）—0～4歳の子どもで殺虫処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの比率。

発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率（%）—調査前2週間に発熱した0～4歳の子どもうち、（現地の定義による）適切な抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

データの主な出典

改善された水源を利用する人および適切な衛生施設を利用する人の比率—ユニセフ、世界保健機関（WHO）、複数指標クラスター調査（MICS）、人口保健調査（DHS）。

政府資金によるワクチン購入—ユニセフ、WHO。

予防接種—ユニセフ、WHO。

肺炎と疑われる症状—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

ORTの使用率—DHS、MICS。

マラリア—DHS、MICS。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた最も最近の年次のものであることを示す。
- β DPT1接種率は少なくともDPT3と同率でなければならない。DPT1接種率がDPT3よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフとWHOは、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。
- ± 今年の白書では、昨年同様、過去の白書で採用していた「急性呼吸器感染症（ARI）」に代わり、「肺炎と疑われる症状」という用語を使用している。しかし、データ収集方法は変わっておらず、本統計表に掲載されている推計値は過去の白書に掲載されている推計値と比較可能なものである。本改訂に関わる詳細は110ページの「データについての一般的な留意事項」を参照。
- λ 今年の白書では、WHOとユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を2回以上受けているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの比率を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されていると可能性がある他のシナリオ（例えば、部分的に実施された予防接種活動においてTTの接種を受けた場合）を把握しまたは含めることにより、この指標の正確性を高めることも目指している。この手法の詳細については、110ページの「データについての一般的な留意事項」を参照。
- ** 中国を除く。