

表2 栄養指標

国・地域	子どもの比率 (%) 2000-2007*				栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2007*					ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2007		ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 2000-2007*
	低出生体重 児出生率 (%) 2000-2007*	母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重† (WHO基準母集団)			消耗症‡ (NCHS/WHO)		少なくとも 年1回補給‡ (%)	年2回 補給△ (%)	
					中・重度	中・重度	重度	中・重度	中・重度			
アフガニスタン	-	-	29	54	33y	39y	12y	7y	54y	94	92	28
アルバニア	7	40	69	22	6	8	1	7	22	-	-	60
アルジェリア	6	7	39	22	3	4	1	3	11	-	-	61
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	12	11	77	37	26	31	8	6	45	36	36	35
アンティグアバーブーダ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	7	-	-	28	2y	4y	-	1y	4y	-	-	90x
アルメニア	8	33	57	15	4	4	0	5	13	-	-	97
オーストラリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	12	12	44	16	8	10	2	5	21	95	95w	54
バハマ	7x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バーレーン	8x	34x	65x	41x	-	9x	2x	5x	10x	-	-	-
バングラデシュ	22	37	52	89	41	46	-	16	36	95	94	84
バルバドス	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベラルーシ	4	9	38	4	1	1	0	1	3	-	-	55
ベルギー	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	8	10	-	27	-	6	1	1	18	-	-	90x
ベナン	15	43	72	57	18	23	5	7	38	73	73	55
ブータン	15x	-	-	-	14x	19x	3x	3x	40x	48	48	96
ボリビア	7	54	74	46	5	8	1	1	27	-	-	90
ボスニア・ヘルツェゴビナ	5	18	29	10	1	2	0	3	7	-	-	62
ボツワナ	10	34	57	11	11	13	2	5	23	-	-	66
ブラジル	8	-	30x	17x	4	5	-	-	-	-	-	88
ブルネイ	10x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ブルキナファソ	16	7	50	85	32	37	14	23	35	95	73	34
ブルンジ	11	45	88	-	35	39	14	7	53	83	83	98
カンボジア	14	60	82	54	28	36	7	7	37	76	76	73
カメルーン	11	21	64	21	16	19	5	6	30	-	-	49
カナダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カボヴェルデ	13x	57x	64x	13x	-	-	-	-	-	-	-	0x
中央アフリカ共和国	13	23	55	47	24	29	8	10	38	78	78	62
チャド	22	2	77	65	-	37	14	14	41	54	54	56
チリ	6	85k	-	-	-	1y	-	0y	1y	-	-	100x
中国	2	51	32	15	6	7	-	-	11	-	-	94
コロンビア	9	47	65	32	5y	7y	1y	1y	12y	-	-	92x
コモロ	25	21	34	45	-	25	-	8	44	93	0	82
コンゴ	13	19	78	21	11	14	3	7	26	95	79	82
クック諸島	3	19x	-	-	-	10x	-	-	-	-	-	-
コスタリカ	7	35x	47x	12x	-	5x	0x	2x	6x	-	-	92x
コートジボワール	17	4	54	37	16	20	4	7	34	63	4	84
クロアチア	5	23x	-	-	-	1x	-	1x	1x	-	-	90x
キューバ	5	26	47	16	-	4	0	2	5	-	-	88
キプロス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	7	65	31	37	18y	23y	8y	7y	37y	95	95	40
コンゴ民主共和国	12	36	82	64	28	31	9	13	38	79	79	72
デンマーク	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	10	1	23	18	24	29	10	21	33	95	94	0
ドミニカ	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	11	4	36	15	-	5	1	1	7	-	-	19
エクアドル	16x	40	77	23	6	9	1	2	23	-	-	99x
エジプト	14	38	67	37	5	6	1	4	18	87	87w	78
エルサルバドル	7	24	76	43	6y	10y	1y	1y	19y	20	13	62
赤道ギニア	13	24	-	-	-	19	4	7	39	-	-	33
エリトリア	14	52	43	62	35	40	12	13	38	51	50	68
エストニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	20	49	54	-	33	38	11	11	47	88	86	20

	子どもの比率 (%) 2000-2007 *				栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2007 *					ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2007		ヨード 添加塩を 使う(世帯 %) 2000-2007 *
	低出生体重 児出生率 (%) 2000-2007 *	母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重 † (WHO基準母集団)			消耗症 † (NCHS/WHO)	発育障害 † (NCHS/WHO)	少なくとも 年1回補給 ‡ (%)	年2回 補給 † (%)	
					中・重度	中・重度	重度					
フィジー	10x	47x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31x
フィンランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランス	7x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	14	6	62	9	8	12	2	3	21	90	0	36
ガンビア	20	41	44	53	16	20	4	6	22	93	82	7
グルジア	5	11	35	20	2	2	0	2	10	-	-	87
ドイツ	7x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガーナ	9	54	58	56	13	18	3	5	22	95	77	32
ギリシャ	8x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	9	39x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	12	51	67	47	18y	23y	4y	2y	49y	33	29	40
ギニア	12	27	41	71	22	26	7	9	35	95	94	51
ギニアビサウ	24	16	35	61	15	19	4	7	41	66	64	1
ガイアナ	13	11	42	31	10	12	2	8	14	-	-	-
ハイチ	25	41	87	35	18	22	6	9	24	-	-	3
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	10	30	69	48	8	11	1	1	25	-	-	80x
ハンガリー	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インド	28	46	57	77	43	46	-	19	38	53	33	51
インドネシア	9	40	75	59	23	28	9	-	-	87	87	73
イラン	7x	23	68	58	-	11x	2x	5x	15x	-	-	99
イラク	15	25	51	36	6	8	1	5	21	-	-	28
アイルランド	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	12	15	36	24	3	4	-	4	3	-	-	100x
日本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	12	22	66	11	-	4	1	2	9	-	-	88
カザフスタン	6	17	39	16	4	4	1	4	13	-	-	92
ケニア	10	13	84	57	16	20	4	6	30	22	15	91
キリバス	5x	80x	-	-	-	13x	-	-	-	-	-	-
クウェート	7x	12x	26x	9x	-	10x	3x	11x	24x	-	-	-
キルギス	5	32	49	26	2	3	0	4	14	95	95	76
ラオス	14	23	10	47	31	37	9	7	40	83	69	75
ラトビア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	6	27	35	11	-	4	-	5	11	-	-	92
レソト	13	36	79	60	-	20	4	4	38	85	38	91
リベリア	-	35	70	45	23	26	8	6	39	85	85	-
リビア	7x	-	-	23x	4x	5x	1x	3x	15x	-	-	90x
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	17	67	78	64	36	42	11	13	48	95	95	75
マラウイ	14	57	89	72	15	21	4	4	46	90	90	50
マレーシア	9	29x	-	12x	-	8	1	-	-	-	-	-
モルディブ	22	10	85	-	-	30	7	13	25	62	62	44
マリ	19	38	30	56	27	32	10	13	34	95	89	79
マルタ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	12x	63x	-	-	-	-	-	-	-	39	39	-
モーリタニア	-	20	78	57	-	32	10	13	35	95	89	2
モーリシャス	14	21	-	-	-	15x	2x	14x	10x	-	-	0x
メキシコ	8	38x	36x	21x	3	5	-	2	13	-	-	91
ミクロネシア連邦	18	60x	-	-	-	15x	-	-	-	-	-	-
モルドバ	6	46	18	2	-	4	1	4	8	-	-	60
モナコ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	6	57	57	65	5	6	1	2	21	95	94	83
モンテネグロ	4	19	35	13	2	3	1	3	5	-	-	71
モロッコ	15	31	66	15	9	10	2	9	18	-	-	21
モザンビーク	15	30	80	65	20	24	6	4	41	48	42	54
ミャンマー	15	15	66	67	-	32	7	9	32	94	93	60
ナミビア	14	24	72	28	-	24	5	9	24	-	-	63
ナウル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 栄養指標

	子どもの比率 (%) 2000-2007*				栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2007*					ビタミンAの補給率 (6-59カ月児) 2007		ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 2000-2007*
	低出生体重 児出生率 (%) 2000-2007*	母乳のみ (6カ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9カ月)	母乳育児 継続 (20-23カ月)	低体重† (WHO基準母集団) 中・重度	低体重† (NCHS/WHO) 中・重度		消耗症‡ (NCHS/WHO) 中・重度	発育障害‡ (NCHS/WHO) 中・重度	少なくとも 年1回補給‡ (%)	年2回 補給△ (%)	
						中・重度	重度					
ネパール	21	53	75	95	39	45	10	12	43	95	95	63
オランダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83x
ニカラグア	12	31	83	43	-	7	1	1	17	95	-	97
ニジェール	27	9	73	-	39	44	15	10	50	95	95	46
ナイジェリア	14	17	64	34	24	29	9	9	38	77	55	97
ニウエ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パレスチナ自治区	7	27	-	-	-	3	0	1	10	-	-	86
オマーン	9	-	91	73	13x	18x	1x	7x	10x	-	-	61x
パキスタン	19x	37	36	55	31	38	13	13	37	95	95	17
パラオ	9x	59x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パナマ	10	25x	38x	21x	6x	8x	1x	1x	18x	-	-	95x
バブアニューギニア	11x	59x	74x	66x	-	-	-	-	-	7	7	-
パラグアイ	9	22	60	-	3	4	-	1	14	-	-	94
ペルー	10	63	82	47	6	5	1	1	30	-	-	91
フィリピン	20	34	58	32	21	28	-	6	30	83	83	45
ポーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カタール	10x	12x	48x	21x	-	6x	-	2x	8x	-	-	-
韓国	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルーマニア	8	16	41	-	4	3	0	2	10	-	-	74
ロシア連邦	6	-	-	-	-	3x	1x	4x	13x	-	-	35
ルワンダ	6	88	69	77	18	23	4	4	45	89	76	88
セントクリストファー・ネイビス	9	56x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
セントルシア	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セントビンセント・グレナディーン	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	8	60	60	18	7	9	1	8	23	55	48	37
サウジアラビア	11x	31x	60x	30x	-	14x	3x	11x	20x	-	-	-
セネガル	19	34	61	42	14	17	3	8	16	94	94	41
セルビア	5	15	39	8	1	2	0	3	6	-	-	73
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	24	8	52	57	25	30	8	9	40	95	86	45
シンガポール	8	-	-	-	3	3	0	2	2	-	-	-
スロバキア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソロモン諸島	13x	65	-	-	16x	21x	-	-	-	-	-	-
ソマリア	-	9	15	35	32	36	12	11	38	89	4	1
南アフリカ	15x	7	46	-	10x	12x	2x	3x	25x	-	-	62x
スペイン	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	22	53	-	73	23y	29y	-	14y	14y	-	-	94
スーダン	31x	16	47	40	-	41	15	16	43	90	90	1
スリナム	13	9	25	11	7	10	1	5	8	-	-	-
スワジランド	9	32	77	31	5	7	-	2	24	-	-	80
スウェーデン	4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スイス	6x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリア	9	29	37	16	9	10	2	9	22	-	-	79
タジキスタン	10	25	15	34	14	17	4	7	27	92	92	46
タイ	9	5	43	19	7	9	0	4	12	-	-	47
旧ユーゴスラビア・マケドニア	6	37x	8x	10x	2	2	0	2	9	-	-	94
東ティモール	12	31	82	35	-	49	15	25	54	57	50	60
トーゴ	12	28	35	44	22	26	7	14	24	95	64	25
トンガ	3	62x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリニダード・トバゴ	19	13	43	22	-	6	1	4	4	-	-	28
チュニジア	7	47	-	22	-	4	1	2	12	-	-	97
トルコ	16x	21	38	24	-	4	1	1	12	-	-	64
トルクメニスタン	4	11	54	37	8	11	2	6	15	-	-	87
ツバル	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウガンダ	14	60	80	54	16	20	5	5	32	64	-	96

	子どもの比率 (%) 2000-2007*				栄養不良の5歳未満児の比率 (%) 2000-2007*					ビタミンAの補給率 (6-59ヵ月児) 2007		ヨード 添加塩を 使う世帯 (%) 2000-2007*
	低出生体重 児出生率 (%) 2000-2007*	母乳のみ (6ヵ月未満)	母乳と 補助食品 (6-9ヵ月)	母乳育児 継続 (20-23ヵ月)	低体重† (WHO基準母集団)		消耗症‡ (NCHS/WHO)	発育障害‡ (NCHS/WHO)	少なくとも 年1回補給‡ (%)	年2回 補給△ (%)		
					中・重度	中・重度						
ウクライナ	4	6	49	11	-	1y	0y	0y	3y	-	-	18
アラブ首長国連邦	15x	34x	52x	29x	-	14x	3x	15x	17x	-	-	-
英国	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	10	41	91	55	17	22	4	3	38	93	93	43
米国	8	-	-	-	1y	2y	0y	0y	1y	-	-	-
ウルグアイ	8	54	32	31	-	5	1	2	11	-	-	-
ウズベキスタン	5	26	45	38	4	5	1	3	15	84	84	53
バヌアツ	6	50x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベネズエラ	9	7x	50x	31x	-	5	-	4	12	-	-	90x
ベトナム	7	17	70	23	-	20	5	8	36	95	95w	93
イエメン	32x	-	-	-	42	46	15	12	53	47	47w	30
ザンビア	12	61	93	42	15	19	3	5	39	95	95	77
ジンバブエ	11	22	79	-	12	17	3	6	29	83	83	91

要約

サハラ以南のアフリカ	15	31	68	51	24	28	8	9	38	77	67	64
東部・南部アフリカ	14	40	71	56	23	28	7	7	40	73	68	56
西部・中部アフリカ	15	23	65	47	24	28	9	10	36	81	67	72
中東と北アフリカ	12	26	57	36	11	17	5	8	26	-	-	60
南アジア	27	44	53	75	41	45	-	18	38	64	50	51
東アジアと太平洋諸国	6	43	45	27	11	14	-	-	16	86	86**	86
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	-	-	-	5	6	-	2	16	-	-	83
CEE/CIS	6	20	41	23	-	5	1	2	12	-	-	50
先進工業国§	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国§	15	39	55	51	24	26	-	11	30	72	62**	70
後発開発途上国§	17	37	64	64	30	34	9	11	40	84	82	55
世界	14	38	55	50	23	25	-	11	28	72	62**	68

§ 各国、地域グループに属する領域も含む。分類については152ページ参照。

指標の定義

低出生体重—出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。

低体重(WHO基準母集団)—中・重度:2006年に発表された世界保健機関(WHO)の“WHO Child Growth Standards”の基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

低体重(NCHS/WHO)—中・重度:The National Center for Health Statistics(NCHS)とWHOによる年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。重度:NCHSとWHOによる年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満である生後0～59ヵ月児の割合。

消耗症(NCHS/WHO)—中・重度:NCHSとWHOによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

発育障害(NCHS/WHO)—中・重度:NCHSとWHOによる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

ビタミンAの補給率—2007年にビタミンAの補給を受けた生後6～59ヵ月児の割合。

ヨード添加塩を使う世帯—適切なヨード添加処理が施された塩(15ppm以上)を消費する世帯の割合。

データの主な出典

低出生体重—人口保健調査(DHS)、複数指標クラスター調査(MICS)、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、世界保健機関(WHO)。

母乳育児—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

低体重・消耗症・発育障害—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。

ビタミンA—ユニセフ。

ヨード添加塩—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域別・世界全体の平均値の算出にあたって計算に入れられていないことを示す。
- y 列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のデータ、標準的な定義によらないデータ、または国内の一部地域のみに関するデータではあるが、地域別・世界全体の平均値の算出にあたっては計算に入れられたことを示す。
- k 生後4ヵ月未満の乳児への母乳のみの育児を表す。
- w ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が6～59ヵ月よりも狭く設定されている国を示す。補給率は対象の月齢層にしたがって報告されている。
- † 今年の白書では、「低体重」について、ひとつの指標を2つの異なる基準集団に適用している。こうした違いがあるため、厳密にはここで提示しているデータと相互に、あるいは過去の白書のデータと比較することはできない。NCHS/WHOの基準集団は広く使われているが、“The WHO Child Growth Standards”が徐々に取って代わりつつある。この移行に関する詳細は114ページの「データについての一般的留意事項」を参照。
- ‡ 消耗症と発育障害のデータは、同一の基準集団に関するものなので、相互に、あるいは過去の白書のデータと比較することができる。
- ‡ 2007年(報告時点での直近の実施年度)に少なくとも1回のビタミンA補給を受けた子どもの割合を示す。
- △ 2007年に2回のビタミンA補給を受けた子どもの割合については、2回の実施時期のうち補給率が低かった方の数字が報告されている。'0'(ゼロ)は2007年にビタミンA補給が1回しか実施されなかったことを示している。
- * データが列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。