

表3 保健指標

国・地域	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2008			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2008			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2009	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2009							破傷風から保護される新生児 ^a (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保護措置を受けた比率 (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち生物質による治療を受けた比率 (%)	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)	マラリア 2006-2009*												
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		1歳児											2005-2009*	2005-2009*	2005-2009*	殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の比率 (%)	殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率 (%)	発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率 (%)							
								結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎	Hib	対応ワクチン											破傷風	2005-2009*	2005-2009*	2005-2009*	2005-2009*	2005-2009*	
														BCG																	DPT1 ^b
アフガニスタン	48	78	39	37	60	30	2	82	94	83	83	76	83	83	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
アルバニア	97	96	98	98	98	98	100	97	99	98	98	97	98	98	87	70	38	63	-	-	-	-	-	-							
アルジェリア	83	85	79	95	98	88	100	99	97	93	92	88	91	93	71	53	59	24	-	-	-	-	-	-							
アンドラ	100	100	100	100	100	100	100	-	98	99	99	98	96	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
アンゴラ	50	60	38	57	86	18	100	83	93	73	73	77	73	73	88	-	-	-	28	18	29	-	-	-							
アンティグアバーブーダ	-	95	-	-	98	-	100	-	99	99	98	99	98	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
アルゼンチン	97	98	80	90	91	77	-	99	95	94	95	99	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
アルメニア	96	98	93	90	95	80	60	99	97	93	94	96	93	-	36	11	59	-	-	-	-	-	-	-							
オーストラリア	100	100	100	100	100	100	100	-	97	92	92	94	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
オーストリア	100	100	100	100	100	100	-	-	97	83	83	83	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
アゼルバイジャン	80	88	71	81	85	77	100	81	79	73	79	67	46	-	36x	-	31	-	-	1x	1x	-	-	-							
バハマ	-	98	-	100	100	100	100	-	98	96	97	98	95	96	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
バーレーン	-	100	-	-	100	-	100	-	98	98	97	99	98	97	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
バングラデシュ	80	85	78	53	56	52	30	99	99	94	94	89	95	-	93	37	22	68	-	-	-	-	-	-							
バルバドス	100	100	100	100	100	100	100	-	93	93	93	94	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ベラルーシ	100	100	99	93	91	97	75	98	97	96	98	99	98	19	-	90	67	54	-	-	-	-	-	-							
ベルギー	100	100	100	100	100	100	-	-	98	99	99	94	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ベリーズ	99	99	100	90	93	86	100	99	99	97	98	97	97	97	88	71	44	26	-	-	-	-	-	-							
ベナン	75	84	69	12	24	4	78	99	99	83	83	72	83	83	92	36	-	42	25	20	54	-	-	-							
ブータン	92	99	88	65	87	54	-	96	98	96	96	98	96	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ボリビア	86	96	67	25	34	9	100	88	87	85	84	86	85	85	74	51	-	54x	-	-	-	-	-	-							
ボスニア・ヘルツェゴビナ	99	100	98	95	99	92	95	97	95	90	90	93	90	80	-	91	73	53	-	-	-	-	-	-							
ボツワナ	95	99	90	60	74	39	1	99	98	96	96	94	93	-	92	14x	-	7x	-	-	-	-	-	-							
ブラジル	97	99	84	80	87	37	100	99	99	99	99	99	98	99	92	50	-	-	-	-	-	-	-	-							
ブルネイ	-	-	-	-	-	-	-	99	98	99	99	99	99	99	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ブルガリア	100	100	100	100	100	100	100	98	98	94	94	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ブルキナファソ	76	95	72	11	33	6	30	92	89	82	84	75	81	81	85	39	15	42	23	10	48	-	-	-							
ブルンジ	72	83	71	46	49	46	8	98	98	92	96	91	92	92	94	38	26	23	8x	8x	30x	-	-	-							
カンボジア	61	81	56	29	67	18	22	98	99	94	95	92	91	-	91	48	-	50	5x	4x	0x	-	-	-							
カメルーン	74	92	51	47	56	35	34	90	88	80	79	74	80	80	91	35	38	22	4	13	58	-	-	-							
カナダ	100	100	99	100	100	99	-	-	93	80	80	93	17	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
カボヴェルデ	84	85	82	54	65	38	84	99	98	99	99	96	99	-	78	51	-	-	-	-	-	-	-	-							
中央アフリカ共和国	67	92	51	34	43	28	74	74	64	54	47	62	54	54	86	32	39	47	16	15	57	-	-	-							
チャド	50	67	44	9	23	4	45	40	45	23	36	23	22	22	60	12x	-	27x	-	1x	53x	-	-	-							
チリ	96	99	75	96	98	83	-	99	98	97	97	96	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
中国	89	98	82	55	58	52	100	97	98	97	99	94	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
コロンビア	92	99	73	74	81	55	92	90	97	92	92	95	92	92	78	62	-	39	3x	-	-	-	-	-							
コモロ	95	91	97	36	50	30	4	80	94	83	84	79	83	38	83	56x	-	31x	-	9x	63x	-	-	-							
コンゴ	71	95	34	30	31	29	100	90	92	91	91	76	91	91	82	48	-	39	8x	6x	48x	-	-	-							
クック諸島	-	98	-	100	100	100	100	99	97	82	82	78	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
コスタリカ	97	100	91	95	95	96	100	81	98	86	80	81	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
コートジボワール	80	93	68	23	36	11	5	95	95	81	77	67	81	81	92	35	19	45	10	3	36	-	-	-							
クロアチア	99	100	97	99	99	98	-	99	99	96	96	98	97	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
キューバ	94	96	89	91	94	81	99	99	98	96	99	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
キプロス	100	100	100	100	100	100	40	-	99	99	99	87	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
チェコ	100	100	100	98	99	97	1	98	98	99	99	98	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
朝鮮民主主義人民共和国	100	100	100	-	-	-	10	98	94	93	98	98	92	-	91	93x	-	-	-	-	-	-	-	-							
コンゴ民主共和国	46	80	28	23	23	23	1	80	91	77	74	76	77	77	85	42	-	42	9	6	30	-	-	-							
デンマーク	100	100	100	100	100	100	-	-	90	89	89	84	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ジブチ	92	98	52	56	63	10	-	90	90	89	89	73	89	89	77	62	43	33	30	20	10	-	-	-							
ドミニカ	-	-	-	-	-	-	100	99	98	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ドミニカ共和国	86	87	84	83	87	74	90	96	85	82	85	79	85	77	86	70	57	55	-	-	-	-	-	-							
エクアドル	94	97	88	92	96	84	100	99	93	75	72	66	75	75	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
エジプト	99	100	98	94	97	92	100	98	97	97	97	95	97	-	85	73	58	19	-	-	-	-	-	-							
エルサルバドル	87	94	76	87	89	83	-	87	99	91	91	95	91	91	87	67	51	-	-	-	-	-	-	-							
赤道ギニア	-	-	-	-	-	-	100	73	65	33	39	51	-	-	75	-	-	36x	-	1x	49x	-	-	-							
エリトリア	61	74	57	14	52	4	-	99	99	99	99	95	99	99	86	44x	-	54x	-	4x	4x	-	-	-							
エストニア	98	99	97	95	96	94	-	97	97	95	95	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
エチオピア	38	98	26	12	29	8	-	76	86	79	76	75	79	79	88	19	5	15	53	33	10	-	-	-							
フィジー	-	-	-	-	-	-	100	99	99	99	99	94	99	99	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
フィンランド	100	100	100	100	100	100	1	-	99	99	99	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

	改善された水源を利用する人の比率 (%) 2008			適切な衛生施設を利用する人の比率 (%) 2008			政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率 (%) 2009	完全に予防接種を受けた比率 (%) 2009							破傷風から保護される新生児 (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%)	肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた比率 (%)	下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率 (%)	マラリア 2006-2009*		
	全国	都市	農村	全国	都市	農村		全国	1歳児					2005-2009*					2005-2009*	2005-2009*	
									結核	3種混合	ポリオ	はしか	B型肝炎								Hib
								対応ワクチン													
								BCG	DPT1 ^β	DPT3 ^β	ポリオ3	はしか	HepB3	Hib3							
ウクライナ	98	98	97	95	97	90	-	95	94	90	91	94	84	81	-	-	-	-	-	-	
アラブ首長国連邦	100	100	100	97	98	95	100	98	98	92	94	92	92	92	-	-	-	-	-	-	
英国	100	100	100	100	100	100	-	-	97	93	93	86	-	93	-	-	-	-	-	-	
タンザニア	54	80	45	24	32	21	21	93	90	85	88	91	85	85	90	59	-	53	39	26	57
米国	99	100	94	100	100	99	-	-	98	95	93	92	92	93	-	-	-	-	-	-	
ウルグアイ	100	100	100	100	100	99	-	99	99	95	95	94	95	95	-	-	-	-	-	-	
ウズベキスタン	87	98	81	100	100	100	58	99	98	98	99	95	98	98	-	68	56	28	-	-	
バヌアツ	83	96	79	52	66	48	100	81	78	68	67	52	59	-	73	-	-	43	-	-	
ベネズエラ	-	-	-	-	-	-	100	87	83	83	73	83	83	83	50	72x	-	51x	-	-	
ベトナム	94	99	92	75	94	67	80	97	97	96	97	97	94	-	87	83	55	65	19	13x	3
イエメン	62	72	57	52	94	33	35	58	77	66	65	58	66	67	66	47x	38	48	-	-	
ザンビア	60	87	46	49	59	43	95	92	92	81	83	85	80	81	90	68	47	56	62	41	43
ジンバブエ	82	99	72	44	56	37	0	91	87	73	69	76	73	73	76	25	16	35	27	17	24

地域別要約

アフリカ [≠]	65	85	52	41	55	32	58	80	82	73	74	71	72	59	81	49	28	33	28	20	34
サハラ以南のアフリカ [≠]	60	83	47	31	44	24	48	78	80	70	72	68	69	61	81	46	23	35	28	20	34
東部・南部アフリカ	59	87	47	36	55	28	58	83	86	77	76	76	75	75	84	46	22	32	41	29	31
西部・中部アフリカ	61	82	46	27	35	21	46	73	74	63	67	60	63	47	79	43	24	34	18	12	36
中東と北アフリカ	86	93	76	80	90	66	79	92	93	89	89	87	87	46	79	76	62	39	-	-	-
アジア [≠]	87	96	82	49	63	40	88	92	90	82	83	82	64	9	86	65**	22**	41**	-	-	6**
南アジア	86	95	83	35	57	26	-	88	86	72	73	74	41	15	86	65	19	37	-	-	7
東アジアと太平洋諸国	88	96	81	60	66	55	95	95	95	93	96	91	92	2	-	66**	-	56**	-	-	1**
ラテンアメリカとカリブ海諸国	93	97	80	80	86	55	99	94	96	92	91	93	86	90	82	55	-	-	-	-	-
CEE/CIS	94	98	88	89	93	82	-	96	97	95	96	96	93	53	-	-	-	31	-	-	-
先進工業国 [§]	100	100	98	99	100	98	-	-	98	95	95	93	66	85	-	-	-	-	-	-	-
開発途上国 [§]	84	94	76	52	68	40	82	88	89	81	82	80	70	34	83	59**	27**	38**	-	-	17**
後発開発途上国 [§]	62	80	54	36	50	31	30	84	89	79	78	77	78	59	86	45	23	43	34	24	33
世界	87	96	78	61	76	45	81	88	90	82	83	82	70	38	83	59**	27**	39**	-	-	17**

地域グループ内の国・地域 (countries and territories) の一覧は、124 ページ参照。

§ それぞれのカテゴリやグループに属する地域 (territories) も含む。ユニセフの分類における国・地域の一覧は、124 ページ参照。

指標の定義

政府資金による定期EPI用ワクチンの購入率—子どもを守るために定期的に実施される予防接種のワクチンのうち、中央政府資金（融資資金を含む）で購入されたものの割合。

EPI—拡大予防接種プログラム。このプログラムにおける予防接種には、結核、ジフテリア・百日咳・破傷風（三種混合：DPT）、ポリオ、はしかの予防接種、および新生児破傷風予防のための妊婦に対する予防接種が含まれる。EPIにその他の（たとえばB型肝炎（HepB）やヘモフィルス・インフルエンザb型菌（Hib）、黄熱病の）予防接種を含めている国もある。

BCG—カルメット・ゲラン菌（結核予防ワクチン）の接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT1）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの初回接種を受けた乳児の割合。

3種混合（DPT3）—ジフテリア・百日咳・破傷風3種混合ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の割合。

HepB3—B型肝炎の予防接種を3回受けた乳児の割合。

Hib3—ヘモフィルス・インフルエンザb型菌ワクチンの予防接種を3回受けた乳児の割合。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち適切な保健措置を受けた子どもの比率（%）—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0~4歳の子どものうち、適切な保健措置を受けた子どもの比率。

肺炎と疑われる症状を呈していた5歳未満児のうち抗生物質を処方された子どもの比率（%）—調査前2週間に肺炎と疑われる症状を呈していた0~4歳の子どものうち、抗生物質を処方された子どもの比率。

下痢をした5歳未満児のうちORTおよび授乳・食事の継続による対応をされた比率—調査前2週間に下痢をした0~4歳の子どものうち、経口補水療法（ORT：経口補水塩または推奨された方法で、家庭で調合された吸収のよい安全な水分）または水分補給を受け、さらに授乳・食事の継続による対応をされた者の比率。

マラリア：

殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の比率（%）—殺虫剤処理を施した蚊帳を少なくとも1張持っている家庭の比率。

殺虫剤処理を施した蚊帳で眠る5歳未満児の比率（%）—0~4歳の子どもの殺虫剤処理を施した蚊帳の下で眠った子どもの比率。

発熱した5歳未満児のうち抗マラリア剤を与えられた比率（%）—調査前2週間に発熱した0~4歳の子どものうち、抗マラリア剤を与えられた子どもの比率。

データの主な出典

改善された水源を利用する人および適切な衛生施設を利用する人の比率—ユニセフと世界保健機関（WHO）の合同モニタリング・プログラム。

政府資金によるワクチン購入—ユニセフ、WHO。

予防接種—ユニセフ、WHO。

肺炎と疑われる症状—人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査。

ORTおよび授乳・食事の継続—DHS、MICS、その他の国別世帯調査。

マラリアの予防と治療—DHS、MICS、マラリア指標調査。

注

- データなし。
- x データが列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの、標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、かつ地域平均や世界平均の算出には含まれていないことを示す。
- β DPT1 接種率は少なくとも DPT3 と同率でなければならない。DPT1 接種率が DPT3 よりも小さいことは、データ収集・報告プロセスの欠陥を反映するものである。ユニセフと WHO は、各国・各地域の機関と協力してこのような欠陥を解消すべく取り組んでいる。
- λ WHO とユニセフは、妊婦が破傷風トキソイド（TT）ワクチンの接種を2回以上受けているという理由により出生時に破傷風から保護されていると考えられる子どもの比率を計算するモデルを採用した。このモデルでは、女性が保護されている可能性がある他のシナリオ（例えば、補完的に実施された予防接種活動において TT の接種を受けた場合）を把握し、または含めることにより、この指標の正確性を高めることも目指している。この手法の詳細については、< www.childinfo.org > を参照。
- * データが、列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- ** 中国を除く。

訳注) 日本におけるポリオワクチンは「2回接種」での値