

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳育児 (6カ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8カ月) (%)	必要な最低限の食事 をとる子どもの割合 (6-23カ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%)	発育阻害(%)	消耗症(%)	過体重(%)	ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切な ヨード添加塩の 消費率 (%)
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup> 2009-2013*				2013	2009-2013*
	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*
アフガニスタン	-	54	-	-	-	54 x	33 x	59 x	9 x	5 x	97	20
アルバニア	-	43	39	78	-	31	6	23	9	23	-	75
アルジェリア	6 x	50 x	7 x	-	-	22 x	4 x	16 x	4 x	13 x	-	61 x
アンドラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンゴラ	12 x	55 x	-	-	-	-	16 x	29 x	8 x	-	48	45 x
アンティグア・バーブーダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルゼンチン	7	53	33	93	-	29	2 x	8 x	1 x	10 x	-	-
アルメニア	8	36	35	75	32	23	5	21	4	17	-	97 x
オーストラリア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーストリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アゼルバイジャン	10 x	32 x	12 x	83 x	-	16 x	8 x	27 x	7 x	14 x	87 w	54 x
バハマ	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バーレーン	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バングラデシュ	22 x	47	64	62	21	90	37	41	16	2	97	58
バルバドス	12	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	17
ベラルーシ	5	53	19	64	-	12	1 x	5 x	2 x	10 x	-	85
ベルギー	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベリーズ	11	62	15	69	-	35	6	19	3	8	-	-
ベナン	15 x	50	33	59	16	68	20 x	45 x	8 x	11 x	99	86
ブータン	10	59	49	67	-	66	13	34	6	8	45	-f
ボリビア	6 x	64 x	60 x	83 x	-	40 x	5 x	27 x	1 x	9 x	40	-f
ボスニア・ヘルツェゴビナ	5	42	19	71	-	12	2	9	2	17	-	62 x,y
ボツワナ	13 x	40 x	20 x	-	-	6 x	11 x	31 x	7 x	11 x	83	65 x
ブラジル	9	43 x	39 x	94 x	-	26 x	2 x	7 x	2 x	7 x	-	96 x
ブルネイ	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルガリア	9	-	-	-	-	-	2 x	9 x	3 x	14 x	-	92
ブルキナファソ	14	42	38	57	3	80	24	33	11	-	99	34 x,f
ブルンジ	13	74	69	70	9	79	29	58	6	3	75	-f
カボヴェルデ	6 x	73 x	60 x	-	-	13 x	-	-	-	-	-	75 x
カンボジア	11	66	74	88	24	43	29	41	11	2	90	-f
カメルーン	11 x	40	20	70	-	24	15	33	6	7	99	85
カナダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央アフリカ共和国	14	44	34	60	-	32	24	41	7	2	40	65
チャド	20	29	3	46	-	59	30	39	16	3	91	54
チリ	6	-	-	-	-	-	1	2	0	10	-	-
中国	-	41 x	28 x	-	-	9 x	3	9	2	7	-	97 y
コロンビア	10	57	43	86	-	33	3	13	1	5	-	-
コモロ	25 x	34	12	81	6	57	17	32	11	11	-	77 x,f
コンゴ	13 x	24	21	90	-	17	12	25	6	4	-	73 x,f
クック諸島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳育児 (6カ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8カ月) (%)	必要な最低限の食事 をとる子どもの割合 (6-23カ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%)	発育障害(%)	消耗症(%)	過体重(%)	ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切な ヨード添加塩の 消費率 (%)
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup> 2009-2013*				2013	2009-2013*
	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*
コスタリカ	7	60	33	86	-	28	1	6	1	8	-	-
コートジボワール	17 x	31	12	64	5	38	16	30	8	3	99	30 x,f
クロアチア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キューバ	5	77	49	77	-	17	3 x	7 x	2 x	-	-	88 x
キプロス	12 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チェコ	8	-	-	-	-	-	2 x	3 x	5 x	4 x	-	-
朝鮮民主主義人民共和国	6	28	69	66	-	22	15	28	4	-	98	25
コンゴ民主共和国	10	43	37	52	-	53	24	44	9	5	98	59
デンマーク	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブチ	10 x	55 x	1 x	35 x	-	18 x	30	34	22	8	66	0 x
ドミニカ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドミニカ共和国	11 x	65 x	7	81 x	-	14	3 x	10 x	2 x	8 x	-	-f
エクアドル	9	55	40 x	74	-	19	6	25	2	-	-	-
エジプト	13 x	56 x	53 x	69 x	-	35 x	7 x	31 x	8 x	21 x	-	78 x
エルサルバドル	9	33 x	31 x	-	-	54 x	7 x	21 x	2 x	6 x	-	62 x
赤道ギニア	13 x	21	7	76	11	5	6	26	3	10	-	-f
エリトリア	14 x	93	69	40 x	29 y	73	39	50	15	2	37	68 x
エストニア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エチオピア	20 x	52	52	49	4	82	29	44	10	2	79	20 x,f
フィジー	10 x	57 x	40 x	-	-	-	5 x	8 x	6 x	5 x	-	-
フィンランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランス	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガボン	14 x	32	6	82	4	4	7	18	3	8	-	-f
ガンビア	10	52	34	34	-	31	17	23	10	2	-	22
グルジア	7	69	55	-	-	17	1	11	2	20	-	100
ドイツ	7	-	-	-	-	-	1 x	1 x	1 x	4 x	-	-
ガーナ	11	46	46	75	31	37	13	23	6	3	96	35
ギリシャ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレナダ	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グアテマラ	11	56	50	-	-	46	13	48	1	5	13	-f
ギニア	12 x	17	21	43	4	66	19	31	10	4	-	-f
ギニアビサウ	11	55	38	43	-	65	18	32	6	3	97	12
ガイアナ	14	43	33	81	-	49	11	20	5	7	-	10
ハイチ	23	47	40	87	14	31	12	22	5	4	13	3 x,f
バチカン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホンジュラス	10	64	31	70	54	43	7	23	1	5	59	-
ハンガリー	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイスランド	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インド	28 x	41 x	46 x	56 x	-	77 x	44 x	48 x	20 x	2 x	53	71

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳育児 (6カ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8カ月) (%)	必要な最低限の食事 をとる子どもの割合 (6-23カ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%)	発育阻害(%)	消耗症(%)	過体重(%)	ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切な ヨード添加塩の 消費率 (%)
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup> 2009-2013*				2013	2009-2013*
	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*
インドネシア	9 x	49	42	91	37	55	20	36	14	12	82	58
イラン	8	69	53	76	-	51	4	7	4	-	-	- f
イラク	13	43	20	36	-	23	9	23	7	12	-	29
アイルランド	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イスラエル	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イタリア	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジャマイカ	11	65	24	55	-	31	3	5	4	4	-	-
日本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヨルダン	13 x	19	23	92	33	13	3	8	2	5	-	- f
カザフスタン	6	68	32	49	-	26	4	13	4	13	-	85
ケニア	8	58	32	85	-	54	16	35	7	5	19	93
キリバス	8	-	69	-	-	82	15	-	-	-	-	-
クウェート	8	-	-	-	-	-	2	4	2	10	-	-
キルギス	6	84	56	62	16	37	4	18	3	9	-	76 x
ラオス	15	39	40	52	-	40	27	44	6	2	87	- f
ラトビア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レバノン	12	-	15	-	-	15	4 x	17 x	7 x	17 x	-	71
レソト	11	53	54	68	-	35	14	39	4	7	-	79
リベリア	14 x	67 x	55	56 x	-	44	15	42	3	-	88	-
リビア	-	-	-	-	-	-	6 x	21 x	7 x	22 x	-	-
リヒテンシュタイン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リトアニア	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルクセンブルク	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マダガスカル	16	66	42	90	-	83	37 x	49	15 x	6 x	94	50
マウワイ	14	95	71	86	19	77	14	48	4	9	90	62
マレーシア	11	-	-	-	-	-	13 x	17 x	-	-	-	-
モルディブ	11	64	48	91	-	68	18	20	10	7	76	44 x
マリ	18	57	20	27	-	46	28 x	39 x	15 x	5 x	98	74 x
マルタ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マーシャル諸島	18 x	73 x	31 x	-	-	53 x	-	-	-	-	-	-
モーリタニア	35	56	27	48	-	36	20	22	12	1	99	7
モーリシャス	14 x	-	21 x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メキシコ	9	39	14	95	-	14	3	14	2	9	-	91 x
ミクロネシア連邦	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モナコ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モンゴル	5	71	66	66	-	65	5	16	2	11	95	70
モンテネグロ	5	25 x	19 x	-	-	13 x	1	9	3	22	-	71 x
モロッコ	15 x	52 x	31 x	86 x	-	15 x	3	15	2	11	-	21 x
モザンビーク	17	77	43	90	13	52	16	43	6	8	99	25 f
ミャンマー	9	76	24	76	-	65	23	35	8	3	-	69

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳育児 (6カ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8カ月) (%)	必要な最低限の食事 をとる子どもの割合 (6-23カ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%)	発育阻害(%)	消耗症(%)	過体重(%)	ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切な ヨード添加塩の 消費率 (%)
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup>				2013	2009-2013*
	2009-2013*						2009-2013*				2013	2009-2013*
ナミビア	16 x	71 x	24 x	91 x	-	28 x	18 x	30 x	8 x	5 x	63	57 x
ナウル	27 x	76 x	67 x	-	-	65 x	5 x	24 x	1 x	3 x	-	-
ネパール	18	45	70	66	-	93	29	41	11	2	99	80
オランダ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニュージーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニカラグア	8	76 x	31 x	-	-	43 x	6 x	23 x	2 x	6 x	-	97 x
ニジェール	27 x	53	23	-	6	50	38	43	19	3	96	19
ナイジェリア	15	33	17	67	10	35	31	36	18	5	70	80
ニウエ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルウェー	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オマーン	10	85 x	-	-	-	73 x	9	10	7	2	96 w	-f
パキスタン	32 x	18	38	66	15	56	32	45	11	5	-	69
パラオ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
パナマ	8	-	-	-	-	-	4 x	19 x	1 x	-	-	-
パプアニューギニア	11 x	-	56 x	-	-	72 x	28	50	14	14	-	92 x
パラグアイ	6	47 x	24 x	-	-	14 x	3 x	18 x	1 x	7 x	-	93 y
ペルー	7	56	72	82	-	54 y	4	18	1	7	-	88
フィリピン	21 x	54 x	34 x	90 x	-	34 x	20	30	8	5	89	45 x
ポーランド	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルトガル	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カタール	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓国	4 x	-	-	-	-	-	1	3	1	7	-	-
モルドバ	6	65	36	62	-	12	3 x	11 x	6 x	9 x	-	44
ルーマニア	8	-	16 x	-	-	-	4 x	13 x	4 x	8 x	-	74 x
ロシア連邦	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-f
ルワンダ	7	71	85	79	17	84	12	44	3	7	0	87 x,f
セントクリストファー・ネイビス	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-f
セントルシア	10	50	-	-	-	-	3	3	4	6	-	46
セントビンセント・グレナディーン	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サモア	10	88	51	-	-	74	-	-	-	-	-	-
サンマリノ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サントメ・プリンシペ	10	45	51	74	-	20	14	32	11	12	67	65
サウジアラビア	9	-	-	-	-	-	5 x	9 x	12 x	6 x	-	-
セネガル	19	48	39	67	9	51	17	19	9	2	99	43
セルビア	6	8	14	84	-	15	2	7	4	16	-	32 x
セーシェル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シエラレオネ	11	45	32	25	-	48	21	45	9	10	99	63
シンガポール	10	-	-	-	-	-	3 x	4 x	4 x	3 x	-	-
スロバキア	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スロベニア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児 出生率 (%)	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳育児 (6カ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8カ月) (%)	必要な最低限の食事 をとる子どもの割合 (6-23カ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	低体重(%)	発育阻害(%)	消耗症(%)	過体重(%)	ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切な ヨード添加塩の 消費率 (%)
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup> 2009-2013*				2013	2009-2013*
	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*	2009-2013*
ソロモン諸島	13 x	75 x	74 x	-	-	67 x	12 x	33 x	4 x	3 x	-	-
ソマリア	-	26 x	9 x	16 x	-	35 x	33 x	42 x	13 x	5 x	-	4 y
南アフリカ	-	61 x	8 x	-	-	31 x	9 x	24 x	5 x	-	42 w	-
南スーダン	-	48	45	21	-	38	28	31	23	6	66	45
スペイン	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スリランカ	17 x	80 x	76 x	-	-	84 x	26	15	21	1	92	92 x
パレスチナ	9	62	29	61	-	13	4	11	3	5	-	77
スーダン	-	-	41	51	-	40	32	35	16	-	0	10
スリナム	14	45	3	47	-	15	6	9	5	4	-	-
スワジランド	9	55	44	66	-	11	6	31	1	11	31	52
スウェーデン	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スイス	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シリア	10	46	43	-	-	25	10	28	12	18	-	79 x
タジキスタン	10 x	50	34	49	20	50	13	27	10	7	93	39
タイ	11	46	12	75	-	18	9	16	7	11	-	71
旧ユーゴスラビア・マケドニア	6	21	23	41	-	13	1	5	2	12	-	94 x,y
東ティモール	12 x	82	52	82	-	33	45	58	19	6	40	60 x
トーゴ	11	46	62	44	-	64	17	30	5	2	61	32
トンガ	-	79	52	-	-	30	-	-	-	-	-	-
トリニダード・トバゴ	12	41 x	13 x	83 x	-	22 x	4 x	5 x	5 x	5 x	-	28 x
チュニジア	7	40	9	27	-	19	2	10	3	14	-	97 x
トルコ	11 x	39 x	42 x	-	-	22 x	2 x	12 x	1 x	-	-	69 x
トルクメニスタン	5	18 x	13 x	-	-	27 x	11 x	28 x	7 x	-	-	75 x,f
ツバル	6 x	15 x	35 x	-	-	51 x	2 x	10 x	3 x	6 x	-	-
ウガンダ	12	53	63	67	-	46	14	34	5	4	65	87 x,f
ウクライナ	5	66	20	43	-	22	1 x	4 x	0 x	-	-	21
アラブ首長国連邦	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英国	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンザニア	8	49	50	92	-	51	14	35	7	-	92	56
米国	8	-	-	-	-	-	1	2	1	6	-	-
ウルグアイ	8	-	-	-	-	-	4	11	1	7	-	-
ウズベキスタン	5 x	67 x	26 x	47 x	-	38 x	4 x	20 x	5 x	13 x	99	53 x
バヌアツ	10 x	72 x	40 x	68 x	-	32 x	12 x	26 x	6 x	5 x	-	23 x
ベネズエラ	9	-	-	-	-	-	3	13	4	6	-	-
ベトナム	5	40	17	50	-	19	12	23	4	5	-	45
イエメン	32	30 x	10	-	-	45	36	47	13	2	87	30 x
ザンビア	11 x	57 x	61 x	94 x	-	42 x	15 x	46 x	6 x	8 x	93	64 x
ジンバブエ	11	65	31	86	11	20	10	32	3	6	34	-f

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児出生率 (%)	母乳育児の早期開始 (%)	完全母乳育児 (6ヵ月未満) (%)	離乳食開始 (6-8ヵ月) (%)	必要な最低限の食事をとる子どもの割合 (6-23ヵ月) (%)	2歳児の母乳育児 (%)	低体重 (%)	発育障害 (%)	消耗症 (%)	過体重 (%)	ビタミンA完全補給率 (年2回補給) <sup>d</sup> (%)	適切なヨード添加塩の消費率 (%)	
	2009-2013*						中・重度 <sup>e</sup>					2013	2009-2013*
	2009-2013*						2009-2013*					2013	2009-2013*
地域別要約 <sup>g</sup>													
サハラ以南のアフリカ	13	47	36	65	10	51	21	37	9	6	73	59	
東部・南部アフリカ	11	60	51	73	-	62	18	39	7	5	67	-	
西部・中部アフリカ	14	39	25	60	10	44	23	36	11	6	85	65	
中東と北アフリカ	-	-	34	-	-	36	7	18	8	10	-	-	
南アジア	28	39	47	58	-	75	32	38	15	4	60	69	
東アジアと太平洋諸国	-	44	30	79**	-	21	5	12	4	6	85	86	
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	49	32	88	-	27	3	11	1	7	-	-	
CEE/CIS	6	-	-	-	-	-	2	11	1	16	-	-	
後発開発途上国	14	53	46	62	-	63	22	37	9	4	81	50	
世界	16**	44	38	65**	-	49	15	25	8	6	69	75	

# 国・地域の分類のリスト一覧については、32ページを参照。あるいは<http://data.unicef.org/index.php?section=regional-classifications>を参照。これまでに出版された一連の「世界子供白書」とのデータ比較は推奨できない。

### 指標の定義

**低出生体重児出生率**—出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。

**母乳育児の早期開始**—生後1時間以内に母乳を与えられる新生児の割合。

**母乳のみの育児 (生後6ヵ月未満)**—調査時から24時間以内に、母乳のみを与えられた生後0～5ヵ月の子どもの割合。

**固形、半固形、または軟らかい食品の導入 (6～8ヵ月)**—調査時から24時間以内に、固形、半固形、または軟らかい食品を摂取した生後6～8ヵ月の子どもの割合。

**必要な最低限の食事をとる子どもの割合 (6～23ヵ月)**—月齢6～23ヵ月の母乳で育てられている子どものうち、最小の多様性と最小の食事頻度を保った食事を調査の前日に受け、尚かつ、月齢6～23ヵ月の母乳で育てられていない子どものうち、調査の前日に、少なくとも2回ミルクを飲ませてもらい、ミルク以外に、最小の多様性と最小の食事頻度を保った食事を調査の前日に受けた子どもの割合。

**2歳時の母乳育児 (20～23ヵ月)**—調査時から24時間以内に、母乳を与えられた生後20～23ヵ月の子どもの割合。

**低体重**—中・重度：世界保健機関 (WHO) のWHO Child Growth Standardsの基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年齢相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満である生後0～59ヵ月児の割合。

**発育障害**—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

**消耗症**—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月児の割合。

**過体重**—中・重度：WHOのWHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がプラス2以上である生後0～59ヵ月児の割合。

**ビタミンAの完全補給率**—ビタミンAの補給を当該年におよそ4～6ヵ月空けて、2回受けた生後6～59ヵ月児の推定割合。

**適切なヨード添加塩の消費率**—適切なヨード添加処理が施された塩 (15ppm以上) を消費する世帯の割合。

### データの主な出典

**低出生体重**—人口保健調査 (DHS)、複数指標クラスター調査 (MICS)、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、世界保健機関 (WHO)。

**乳児と幼児への食事**—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

**低体重・消耗症・発育障害**—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。

**ビタミンAの補給**—ユニセフ。

**適切なヨード添加塩の消費率**—DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

### 注

- データなし。
- w ビタミンA補給プログラムの対象とされる月齢層が生後6～59ヵ月よりも狭く設定されている国を示す。補給率は対象の月齢層にしたがって報告されている。
- x データが各列の見出しで指定されている年次もしくは期間以外のもの。2005年～2006年と2007～2008年のインドのデータ並びに2008年の中国のデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の推計値は表示されていない。
- y 標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するものであり、地域平均や世界平均の算出の際には含まれている。
- △ 年に2回のビタミンA補給を受けた子どもの割合について、2回の実施時期のうち補給率が低かった方の数字が報告されている (2012年1～6月に実施された第1回と7～12月の第2回のうちポイントが低い方を報告している)。
- θ 低体重 (中・重度)、発育障害 (中・重度)、消耗症 (中・重度)、過体重 (中・重度) の地域における平均値は、ユニセフ・WHO・世界銀行の合同世界栄養データベース2013年改訂版 (2014年9月に終了) の統計モデルのデータを使って推定された。詳細な情報は<http://data.unicef.org/resources/2013/webapps/nutrition>を参照。
- f 当該国の調査では、国際基準とは同一ではない指標を用いている。データがある場合は、国際基準に合った直近のデータを掲載した。
- \* データが列の見出しで指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
- \*\* 中国を除く。