

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児出生率(%) ^U	母乳育児の早期開始(%)	完全母乳育児(6か月未満)(%)	離乳食開始(6-8カ月)(%)	必要な最低限の食事をとる子どもの割合(6-23カ月)(%)	2歳児の母乳育児(%)	発育阻害(%)	過体重(%)	消耗症(%)		ビタミンA完全補給率(年2回補給) ^A (%)	ヨード添加塩を消費する世帯の割合(%)
									中・重度 ^B	中・重度 ^B	中・重度 ^B	重度 ^B
アフガニスタン	—	41	43	61	16	59	41	5	10	4	98 α	57 S
アルバニア	—	43 x	39 x	78 x	—	31 x	23 x	23 x	9 x	6 x	—	91 x, S
アルジェリア	6 x	36	26	28	—	27	12	12	4	1	—	81 S
アンドラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンゴラ	12 x	48	38	—	13	42	38	3	5	1	14 α	82 S
アンギラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンティグア・バーブーダ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルゼンチン	7	53	33	93	—	29	8 x	10 x	1 x	0 x	—	—
アルメニア	8 x	41	45	90	24	22	9	14	4	2	—	99 S
オーストラリア	6 x	—	—	—	—	—	2 x	8 x	0 x	0 x	—	—
オーストリア	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アゼルバイジャン	10 x	20	12	77	22	16 x	18	13	3	1	96 α, vw	94 γ ^b
バハマ	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バーレーン	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バングラデシュ	22 x	51	55	65	23	87	36	1	14	3	99 α	69 γ ^a
バルバドス	12	40	20 p	—	—	—	8	12	7	2	—	37 S
ベラルーシ	5	53	19	64	—	12	5 x	10 x	2 x	1 x	—	—
ベルギー	7 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベリーズ	11	68	33	79	—	35	15	7	2	1	—	85
ベナン	15 x	47	41	73	14	46	34	2	5	1	95 α	69
ブータン	10 x	78	51	87	—	61	34 x	8 x	6 x	2 x	— α	—
ボリビア	6 x	78	64	83 x	—	40 x	18	9 x	2	1	— α	85 x, S
ボスニア・ヘルツェゴビナ	5	42	19	71	—	12	9	17	2	2	—	—
ボソワナ	13 x	40 x	20 x	—	—	6 x	31 x	11 x	7 x	3 x	57 α	83 x, S
ブラジル	9	43 x	39 x	94 x	—	26 x	7 x	7 x	2 x	0 x	—	98 x, S
英領ヴァージン諸島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブルネイ	12	—	—	—	—	—	20 x	8 x	3 x	0 x	—	—
ブルガリア	9	—	—	—	—	—	9 x	14 x	3 x	1 x	—	92 γ ^a
ブルキナファソ	14 x	42	50	59	3	80	27	1	8	1	99 α	92 x, S
ブルンジ	13 x	74 x	83	70 x	10	81	56	1	5	1	71 α	87 x, S
カボヴェルデ	6 x	73 x	60 x	—	—	13 x	—	—	—	—	—	—
カンボジア	11 x	63	65	82	30	37	32	2	10	2	63 α	68 S
カメルーン	11 x	31	28	83	17	19	32	7	5	1	99 α	86 S
カナダ	6	—	—	—	—	—	—	10 x	—	—	—	—
中央アフリカ共和国	14 x	44 x	34 x	59 x	—	32 x	41	2	7	2 x	3 α	77 S
チャド	20 x	23	0	59	6	65	40	3	13	4	85 α	77 S
チリ	6	—	—	—	—	—	2	9	0	—	—	—
中国	—	41 x	21	60 x	—	9 x	8	7 x	2	1 x	—	96 γ ^b
コロンビア	10	57 x	43 x	86 x	60 x	33 x	13 x	5 x	1 x	0 x	—	—
コモロ	25 x	34	12	81	6	57	32	11	11	4	12 α	82 S
コンゴ	13 x	25	33	84	6	11	21	6	8	3	99 α	90 S
クック諸島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コスタリカ	7	60	33	86	—	28	6 x	8 x	1 x	—	—	—
コートジボワール	17 x	31	12	64	5	38	30	3	8	2	72 α	82 S
クロアチア	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キューバ	5	48	33	91	56	24	7 x	—	2 x	—	—	—
キプロス	12 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チエコ	8	—	—	—	—	—	3 x	4 x	5 x	1 x	—	—
朝鮮民主主義人民共和国	6 x	28	69	66	—	22	28	0 x	4	1	99 α	—
コンゴ民主共和国	10 x	52	48	79	8	66	43	4	8	3	94 α	82 S
デンマーク	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブチ	10 x	55 x	1 x	35 x	—	18 x	34	8	22	9	72 α	4 x, S
ドミニカ	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドミニカ共和国	11 x	38	5	81	45	12	7	8	2	1	—	30 x, S
エクアドル	9	55	40 x	74	—	19	25	8	2	1	—	—
エジプト	13 x	27	40	77	23	20	22	16	10	5	— α	93 γ ^b
エルサルバドル	9	42	47	90	67	57	14	6	2	0	—	—
赤道ギニア	13 x	21	7	76	11	5	26	10	3	2	— α	57 x, S
エリトリア	14 x	93 x	69 x	40 x	—	73 x	50 x	2 x	15 x	4 x	51 α	72 x, S
エストニア	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エチオピア	20 x	73	58	60	7	76	38	3	10	3	74 α	86 S
斐ジー	10 x	57 x	40 x	—	—	—	8 x	5 x	6 x	2 x	—	—
フィンランド	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フランス	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ガボン	14 x	32	6	82	5	4	18	8	3	1	— α	90 S
ガンビア	10 x	52	47	47	8	42	25	3	11	4	27 α	69 S
ジョージア	7	69	55 x	85 x	—	17 x	11 x	20 x	2 x	1 x	—	—

表2 栄養指標

	低出生体重児出生率(%) ^u	母乳育児の早期開始(%)	完全母乳育児(6カ月未満)(%)	離乳食開始(6~8カ月)(%)	必要な最低限の食事をとる子どもの割合(6~23カ月)(%)	2歳児の母乳育児(%)	発育障害(%)	過体重(%)	消耗症(%)		ビタミンA完全補給率(年2回補給) ^a (%)	ヨード添加塩を消費する世帯の割合(%)
									中・重度 ^b	中・重度 ^b	中・重度 ^b	重度 ^b
国・地域	2011-2016*	2011-2016*		2011-2016*		2011-2016*		2011-2016*		2015		2011-2016*
ドイツ	7	—	—	—	—	—	1 x	4 x	1 x	0 x	—	—
ガーナ	11	56	52	73	13	50	19	3	5	1	28 α	57 S
ギリシャ	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グレナダ	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グアテマラ	11 x	63	53	—	52	57	47	5	1	0	15 α	—
ギニア	12 x	17	21	43	4	66	31	4	10	4	69 α	61 S
ギニアビサウ	11 x	34	53	71	8	51	28	2	6	1	87 α	26 S
ガイアナ	14 x	49	23	81	40	41	12	5	6	2	—	43 S
ハイチ	23	47	40	87	14	31	22	4	5	1	21 α	16 S
バチカン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホンジュラス	10	64	31	70	54	43	23	5	1	0	— α	—
ハンガリー	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アイスランド	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インド	28 x	42	55	52	10	67	38	2 x	21	8	53 α	93 γ ^a
インドネシア	9 x	49	42	91	37	55	36	12	14	7	82 α	92 γ ^b
イラン	8	69	53	76	—	51	7	—	4	1	—	—
イラク	13	43	20	36	—	23	23	12	7	4	—	55 S
アイルランド	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イスラエル	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イタリア	7 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジャマイカ	11	65	24	55	—	31	6	9	4	1 x	—	—
日本	10	—	—	—	—	—	7 x	2 x	2 x	0 x	—	—
ヨルダン	13 x	19	23	92	33	13	8	5	2	1	—	88 x, y ^b
カザフスタン	6	83	38	67	45	21	8	9	3	1	— α	94 S
ケニア	8 x	62	61	80	22	53	26	4	4	1	37 α	95 S
キリバス	8	—	69 x	—	—	82 x	—	—	—	—	— α	—
クウェート	8	—	—	—	—	—	5	6	3	1	—	—
キルギス	6	83	41	85	36	23	13	7	3	1	— α	99 S
ラオス	15	39	40	52	—	40	44	2	6	2	88 α	80 S
ラトビア	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レバノン	12 x	41 x	27 x	—	—	11 x	17 x	17 x	7 x	3 x	—	95 x, S
レソト	11 x	65	67	83	11	30	33	7	3	1	— α	85 S
リベリア	14 x	61	55	46	4	44	32	3	6	2	61 α	91 S
リビア	—	—	—	—	—	—	21 x	22 x	7 x	3 x	—	—
リヒテンシュタイン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リトアニア	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ルクセンブルク	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マダガスカル	16 x	66	42	90	—	83	49 x	6 x	15 x	6 x	97 α	68 x, S
マラウイ	14 x	76	61	89	8	72	37	5	3	1	16 α	78 S
マレーシア	11	—	—	—	—	—	18	7	8	—	—	—
モルディブ	11 x	64 x	48 x	91 x	—	68 x	20 x	7 x	10 x	3 x	79 α	—
マリ	18 x	53	33	42	3	53	30	2	14	3	88 α	81 x, S
マルタ	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マーシャル諸島	18 x	73 x	31 x	—	—	53 x	—	—	—	—	— α	—
モーリタニア	35	62	41	66	—	40	28	1	15	4	83 α	24 S
モーリシャス	14 x	—	21 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メキシコ	9	51	31	82	53	24	12	5	1	0	— α	—
ミクロネシア連邦	11 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— α	—
モナコ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モンゴル	5 x	71	47	95	35	53	11	11	1	0	38 α	80 S
モンテネグロ	5	14	17	95	66	9	9	22	3	1	—	—
モントセラト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モロッコ	15 x	30	28	86 x	—	25	15	11	2	1	— α	—
モザンビーク	17	69	41	95	11	52	43	8	6	2	99 α	43 S
ミャンマー	9 x	67	51	75	16	64	29	1	7	1	88 α	81 S
ナミビア	16 x	71	49	80	13	21	23	4	7	3	— α	74 S
ナウル	27 x	76 x	67 x	—	—	65 x	24 x	3 x	1 x	0 x	—	—
ネパール	18	55	66	84	32	89	36	1	10	2	79 α	94 S
オランダ	6 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ニュージーランド	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ニカラグア	8	68	32	—	—	43	23 x	6 x	2 x	1 x	3 α	—
ニジェール	27 x	53	23	—	6	50	42	3	10	2	99 α	59 S
ナイジェリア	15	33	17	67	10	35	33	2	7	2	76 α	93 S
ニウエ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルウェー	5 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オマーン	10	71	33	90	—	48	14	4	8	2	—	—
パキスタン	32 x	18	38	66	15	56	45	5	11	3	98 α	69 γ ^a

表2 栄養指標

国・地域	低出生体重児出生率(%) ^U	母乳育児の早期開始(%)	完全母乳育児(6カ月未満)(%)	離乳食開始(6-8カ月)(%)	必要な最低限の食事をとる子どもの割合(6-23カ月)(%)	2歳児の母乳育児(%)	発育阻害(%)	過体重(%)	消耗症(%)		ビタミンA完全補給率(年2回補給) ^A (%)	ヨード添加塩を消費する世帯の割合(%)	
									中・重度 ^B	中・重度 ^B	中・重度 ^B	重度 ^B	
パラオ	7 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パナマ	8	47	22	61	—	34	19 x	—	1 x	0 x	—	—	
バブアニューギニア	11 x	—	56 x	—	—	72 x	50	14	14	7	— α	—	
バラグアイ	6 x	47 x	24 x	—	—	14 x	11	12	3	0	—	93 y ^b	
ペルー	7	55	68	78	53	55 y	14	7	1	0	—	90 S	
フィリピン	21 x	50	34 x	90 x	—	41	33	4	7	2	72 α	52 y ^b	
ポーランド	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポルトガル	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カタール	8 x	34	29	50	—	32	—	—	—	—	—	—	
韓国	4 x	—	—	—	—	—	3	7	1	0	—	—	
モルドバ	6	61	36	62	—	12	6	5	2	1	—	58 S	
ルーマニア	8	12 x	16 x	—	—	—	13 x	8 x	4 x	1 x	—	—	
ロシア連邦	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ルワンダ	7 x	81	87	57	19	87	37	8	2	1	96 α	91 S	
セントクリストファー・ネイヴィス	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セントルシア	10	50	—	—	—	—	3	6	4	1	—	75 S	
セントビンセント・グレナディーン	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サモア	10 x	88 x	51 x	—	—	74 x	5	5	4	1	—	96 S	
サンマリノ	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サントメ・プリンシペ	10 x	38	74	74	22	24	17	2	4	1	42 α	91 S	
サウジアラビア	9	—	—	—	—	—	9 x	6 x	12 x	5 x	—	—	
セネガル	19	31	33	63	10	48	17	1	7	1	29 α	57 S	
セルビア	6	51	13	97	72	9	6	14	4	1	—	—	
セーシェル	—	—	—	—	—	—	8	10	4	1	—	—	
シェラレオネ	11 x	54	32	63	7	48	38	9	9	4	97 α	74 S	
シンガポール	10	—	—	—	—	—	4 x	3 x	4 x	1 x	—	—	
スロバキア	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スロベニア	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ソロモン諸島	13 x	75 x	74 x	—	—	67 x	32	4	8	3	—	—	
ソマリア	—	23 x	5 x	16 x	—	27 x	25 x	3 x	15 x	5 x	33 α	7 x, S	
南アフリカ	—	61 x	32	—	23	13	27	13	3	1	— α	—	
南スーダン	—	48 x	45 x	21 x	—	38 x	31 x	6 x	23 x	10 x	— α	60 x, S	
スペイン	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スリランカ	17 x	80 x	76 x	—	—	84 x	17	2	15	3	74 α	—	
パレスチナ	9 x	41	39	90	42	12	7	8	1	0	—	88 S	
スーダン	—	69	55	51	15	49	38	3	16	5	72 α	34 S	
スリナム	14 x	45 x	3 x	47 x	—	15 x	9 x	4 x	5 x	1 x	—	—	
スワジランド	9 x	48	64	90	38	8	26	9	2	0	— α	90 S	
スウェーデン	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スイス	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シリア	10 x	46 x	43 x	—	—	25 x	28 x	18 x	12 x	6 x	—	—	
タジキスタン	10 x	50	34	49	20	50	27	7	10	4	97 α	84 S	
タイ	11 x	40	23	85	56	16	11	8	5	1	—	85	
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国	6	21	23	41	—	13	5	12	2	0	—	—	
東ティモール	12 x	93	62	97	18	39	50	2	11	2	61 α	76 x, S	
トーゴ	11 x	61	58	67	12	61	28	2	7	2	6 α	77 S	
トケラウ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トンガ	—	79	52	—	—	30	8	17	5	2	—	—	
トリニダード・トバゴ	12	41 x	13 x	83 x	—	22 x	5 x	5 x	5 x	1 x	—	53 x, S	
チュニジア	7	40	9	27	—	19	10	14	3	2	—	—	
トルコ	11 x	50	30	75	—	34	10	11	2	0	—	85 x, S	
トルクメニスタン	5	73	59	82	77	20	12	6	4	1	— α	100 S	
ターカス・カイコス諸島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ツバル	6 x	15 x	35 x	—	—	51 x	10 x	6 x	3 x	1 x	—	—	
ウガンダ	12	53	66	67	14	43	29	4	4	1	— α	92 S	
ウクライナ	5	66	20	43	—	22	4 x	27 x	0 x	4 x	—	36 S	
アラブ首長国連邦	6 x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
英國	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
タンザニア	8 x	51	59	92	9	43	34	4	5	1	87 α	76 S	
米国	8 x	—	24	—	—	—	2	6	1	0	—	—	
ウルグアイ	8	77	—	—	—	—	11	7	1	0	—	—	
ウズベキスタン	5 x	67 x	26 x	47 x	—	38 x	20 x	13 x	5 x	2 x	98 α	82 x, S	
バヌアツ	10 x	85	73	72	—	49	29	5	4	1	—	33 x, S	
ベネズエラ	9	—	—	—	—	—	13 x	6 x	4 x	—	—	—	
ベトナム	5	27	24	91	59	22	25	5	6	1	97 α, w	61 S	

表2 栄養指標

	低出生体重児出生率 (%) ^u	母乳育児の 早期開始 (%)	完全母乳 育児 (6ヵ月未満) (%)	離乳食開始 (6~8ヵ月) (%)	必要な最低限 の食事をとる 子どもの割合 (6~23ヵ月) (%)	2歳児の 母乳育児 (%)	発育阻害 (%)	過体重 (%)	消耗症 (%)		ビタミンA 完全補給率 (年2回補給) ^a (%)	ヨード添加 塩を消費す る世帯の割 合(%)
									中・重度 ^b	中・重度 ^b	中・重度 ^b	重度 ^b
国・地域	2011-2016*	2011-2016*		2011-2016*		2011-2016*		2011-2016*		2015	2011-2016*	
イエメン	32 x	53	10	69	15	45	47	2	16	5	8 α	49 S
サンビア	11 x	66	73	82	11	42	40	6	6	3	- α	88 S
ジンバブエ	11	58	48	91	8	14	27	6	3	1	45 α	93 S
地域別要約												
東アジアと太平洋諸国	-	43	28	69	40 **	23	9	6	3	1	82	91
ヨーロッパと中央アジア	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東ヨーロッパと中央アジア	6	57	30	69	-	28 r	6 j	13 j	2 j	0 j	-	-
西ヨーロッパ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラテンアメリカとカリブ海諸国	9	54	38	82 N	51 N	32	11	7	1	0	-	-
中東と北アフリカ	-	40	32	63	-	29	15	11	7	3	-	-
北アメリカ	-	-	24	-	-	-	2	8	1	0	-	-
南アジア	-	39	52	56	12	68	36	4 k	16	5	66	88
サハラ以南のアフリカ	-	51	42	71	11	50	34	4	8	2	72	80
東部・南部アフリカ	-	63	55	75	13	53	34	4	7	2	65	78
西部・中部アフリカ	-	40	29	68	9	47	34	4	9	3	78	81
後発開発途上国	-	56	49	70	12	62	-	-	-	-	77	72
世界	-	45	40	66	17	45	23	6	8	3	70	86

国・地域の分類リスト一覧については、150ページを参照。あるいは<data.unicef.org/regionalclassifications>を参照。

これまでに出版された一連の『世界子供白書』とのデータ比較は推奨できない。

指標の定義

低出生体重児出生率－出生時の体重が2,500グラム未満の乳児の割合。

母乳育児の早期開始－生後1時間以内に母乳を与えられる新生児の割合。

完全母乳育児（生後6ヵ月未満）－調査前24時間以内に、母乳のみを与えた生後0～5ヵ月の子どもの割合。

離乳食開始（生後6～8ヵ月）－調査前24時間以内に、固形、半固形、または軟らかい食品を摂取した生後6～8ヵ月の子どもの割合。

必要な最低限の食事をとする子どもの割合（生後6～23ヵ月）－生後6～23ヵ月の母乳で育てられている子どものうち、最小の多様性と最小の食事頻度を保った食事を調査の前に受けた子どものうち、および生後6～23ヵ月の母乳で育てていなければ子どものうち、調査の前に、2回以上のミルクと、ミルク以外に最小の多様性と最小の食事頻度を保つた食事を受けた子どもの割合。

2歳時の母乳育児－調査前24時間以内に、母乳を与えられた生後20～23ヵ月の子どもの割合。

発育阻害－中・重度：WHO Child Growth Standardsによる年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス2未満である生後0～59ヵ月の子どもの割合。

過体重－中・重度：WHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がプラス2以上である生後0～59ヵ月の子どもの割合（肥満を含む）。

消耗症－中・重度：WHO Child Growth Standardsによる身長相応の体重を持つ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス3未満である生後0～59ヵ月の子どもの割合。

ビタミンA完全補給率－ビタミンAの補給を当該年におよそ4～6ヵ月空けて、2回受けた生後6～59ヵ月の子どもの推定割合。

ヨード添加塩を消費する世帯の割合－ヨード（0ppm以上）添加処理が施された食塩を消費する世帯の割合。

データの主な出典

低出生体重児出生率－人口保健調査（DHS）、複数指標クラスター調査（MICS）、その他の国別世帯調査、定期報告制度によるデータ、ユニセフ、世界保健機関（WHO）。

乳児と幼児への食事－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、ユニセフ。

発育阻害・過体重・消耗症及び重度消耗症－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、WHO、ユニセフ。

ビタミンA補給率－ユニセフ。

ヨード添加塩の消費率－DHS、MICS、その他の国別世帯調査、学校での調査、ユニセフ。

注

- データなし。
 - x データが各列の見出して指定されている年次もしくは期間以外のもの。「母乳育児の早期開始」、「離乳食開始」、「2歳時の母乳育児」についての2008年の中国のデータを除き、このようなデータは地域別・世界全体の平均値の算出には含まれていない。2000年以前の年次のデータからの推計値は表示されていない。
 - y データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの。対象期間に該当する場合、地域平均や世界平均の算出の際には含まれている。
 - w より狭い年齢層を目標としたビタミンAプログラムを国内で実施している国を示す。該当プログラムの目標値に対する値をそのまま記載している。
 - r 「優先」に区分された国を示す。ビタミンA補給プログラムへの優先国は、5歳未満児死亡率が高く（出生1,000人に対して70人以上）、かつ／または、5歳未満の子どものビタミンA欠乏症が高く、かつ／または、ビタミンA補給プログラムの歴史がある国である。
 - U 低出生体重のデータは2014年10月以来更新されていない。データが古いことから、多くの地域と世界について数値の集計を停止している。現在、国際機関間プロセスを通じ推計値を出すための新しい手法を適用している途中であり、更新された数値が次号の『世界子供白書』で報告されるであろう。
 - J 東ヨーロッパと中央アジアの推計値はヨーロッパと中央アジアの全てに適するモデルに基づいている。ロシア連邦のデータが入手できなかつたため、データは主に東ヨーロッパあるいは中央アジアの国々からのものである。
 - k 南アジアについては、過体重の子どもの数が2008年～2012年と2013年～2016年という直近の2期間で少ないため、『世界子供白書』に記載していない。しかし、推計値は合同栄養不良推計（The Joint Malnutrition Estimates）で入手できる（<<https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>>）からダウンロードする事ができる。但し、解説には注意が必要である。
 - S ヨード添加塩を消費しない世帯を分母に入れてデータ数を調整した上で再分析した。
 - * データが、列の見出して指定されている期間内に入手できた直近の年次のものであることを示す。
 - ** 中国を除く。
 - r ロシア連邦を除く。
 - N ブラジルを除く。
- 表10および表11の発育阻害（中・重度）の細分類されたデータは人口の重み付けがなされている。つまり、2011～2016年のデータについて各国の直近の推計値を使用している。そのため、この表の世界や地域レベルの推計値と一致しない場合がある。
- △ 年に2回のビタミンA補給を受けた子どもの割合について、2回の実施時期のうち補給率が低かった方の数値が報告されている（2015年1～6月に実施された第1回と7～12月の第2回のうちポイントが低い方を報告している）。VAS優先国のデータのみ表示しているため、集計値はこれらの優先国の数値のみを反映している。